

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

究理堂備用方府序

吾門說內景論病理專主喁蘭之說而藥治雜取漢方興蘭劑漢方名義往々興吾所常說不相合從游者拘泥舊稱而莫能意會之蘭方多無名者及稱呼不馴者亦致初學者之繆迷頃輯錄常用漢蘭諸方省其類似者擇其蘭便者每方撰定新名疏舊稱及方書名于其下令學者一見會其功用所主來歷所由而知論理藥治不相戾為其分類立門不以病症而似藥劑主功則依喁蘭論藥劑之書也大凡藥劑書分類有不過數門者有不下幾十者蘭者太蘭而

詳者太詳今執其中私立十七目而揔之為三門  
皆錄大意於各門之首外治附為分為三編名曰備  
用方府從先人所命也凡辨藥性有以氣者有以味  
者有以質或性者而其中又有性異而味同者有用同  
而功異者有因配合異其功者因煮法製法及服量  
異其用者矣及施之人身諸器之性亦不同一藏府  
也胃之所喜肺之所惡也一血液也血脉之所忌  
門脉之所須也凡此類用藥之至要不可不知  
而漢人立方或有疑於錯繆為者今至用此不可  
不慎於取捨予雖淺學陋識不通深理而略為抉

剔以便初學至輕出入成方之譏固所不辭至其稱家方者係鮮人得効之方稱自製者則予所經驗皆根據漢蘭古方折衷而成非敢妄作也然醫理無窮不可執一以概百苟果於自信誤人匪小吾固富不憚釐正之數矣如辛未歲所著丸散方今所用甚少然姑存之令學者知予學開闡進益有漸耳他年將又有後之視今猶今之視昔者末可知也

文政己丑季春堂主人小石龍撰

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

究理堂備用方府上編目次

卷之一

調脬諸劑

壯脬劑第一

壯腦劑第二

壯神經劑同

壯心劑第三

壯肺劑第四

健胃健腸劑第五

附驅風劑

|       |       |      |     |      |       |       |       |      |       |
|-------|-------|------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 壯宮劑第六 | 緩和劑第七 | 附息神劑 | 卷之二 | 調血諸劑 | 清潤劑第一 | 救敗劑第二 | 鮮凝劑第三 | 附蠲蠲劑 | 克酸劑第四 |
|-------|-------|------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|

|       |       |     |      |       |       |       |      |       |   |
|-------|-------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|---|
| 復良劑第五 | 淳化劑第六 | 卷之三 | 疎利諸劑 | 發汗劑第一 | 湧吐劑第二 | 瀉下劑第三 | 附追蟲劑 | 利尿劑第四 | 附 |
|-------|-------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|---|

解毒諸方

總計十六種

究理堂備用方府上編目次

畢

附言十則

一此書三編、以上編為總括、首舉飲劑之方、後列丸散製劑及外施方等之目、以令知內外施治大意之所在、揔三門十七目、解毒方附焉、飲劑功用、約收於方名中、故不錄主治也、次則丸散鍊糕液浸漿蜜酒醋餌諸方、合十一目、錄主治服法於各方下、又製鍊諸藥、以類分部、錄主能服法於各藥下、此為中編、製鍊法、別有製藥帳秘者、係門人拓君績筆錄、不載於此、次則外施諸方、蒸糊擦洗嗽注、搽敷貼塗氣合十一目、亦錄全治用法於各方下、

毒創治法、刺法、灸法附焉、此為下編、吾家專主  
內科、故至于外科手術、一概畧之、猶文官雖兼籌  
略、而不可用之擐旗斬將也、如其飲液鍊漿等目、  
亦皆所私稱呼、多與古書例異者、看者勿拘、  
一此書、但為我門從學者、作寫之、上中下三編、漸次  
授之、以資勤勉、故其詳略各異者、皆有深意在、  
然其知我罪我者、但在於上編、其他則備員爾、  
一對病處方、唯要切當奏効、無論於飲液丸散、互用  
相濟、而此書似主飲劑者、何也、蓋此間醫流、久  
慣漢土療法、故以飲為主劑、雖病者、亦看慣謂非

此不可、吾先人、首唱蘭學於京坂間、亦未能脱略舊習、近年雖此學大闡、未能盡醫醫習也、焉能醫俗習、是以因循如是、後之君子怒焉、

一 噉蘭醫學、務要日新、其年年所發明印行、不知其幾千百條、然吾未能盡做、猶故國制度大備、不可施之創業家也、且其藥品、一錢、或值數金、勢不可驟辨、猶富豪之習、不可行之寒家也、是漢醫方及舊習之所以不可已也、

一 噉蘭藥劑、多不命名者、盖彼邦名醫、其所日診、不過二十人、而隨病配劑、錄附之藥肆、故方書中

所載、但舉示概要、令學者自裁斷之、間有其方至良、不可增減一味者、則冒以製者之名、傳以為定劑、此間號稱大醫者、常療數百人、而藥劑多出門生之手、故藥無定劑、劑無定名、則每致差繆、是亦吾輩不及彼精微之一也、

一三門首所說藥性、皆據蘭醫、成說、或據成說、而損益之、非出於臆見也、但至于用彼邦所無藥品、不得不用私說、蓋漢人論藥性、如黃連為寒薄苛為涼之類、多疑差繆者、故多不取也、

一蘭醫布欽已曰、各病必有各病之藥、宜據先哲所

發明、而確知其功用、不必論究其理、水銀為治黴聖藥之類是也、此書所說、但謂某味某質能為某用、是舉其概要也、至於各藥性功、不無所考索發明者、俟他日論著、

一飲劑中藥品有宜濃煮者有宜泡出者而概依尋常煎法者亦從此間之医風以者煩也唯通腦飲煎法有先後盖不能区者也其他在用者之斟酌

一蘭方中、蜀葵根錦葵葉砂糖類、人間有嫌惡者、蜀葵錦葵猶或有別藥可代用、第三和胸飲類是也、砂糖具石鹼性、配之諸藥、妙用不可言、特無可代

用姑為丸用之黃石丸類是也

一脚氣、支飲、小兒中暑類、予以為風土病、姑從和  
漢經驗方療之、如中暑驗方、不能增減一味、者學  
者詳之

元端氏識

究理堂備用方府上編卷之一

平安小石龍元瑞父 編撰

河内柘 熙 君績 参訂

大坂斎藤端 履侯 全校

周防南部安貞元吉 全校

調脬諸劑

調 脬 劑

脬字見于素問玉機真藏論曰脫肉破脬破  
如謂纖維衰弱者故今借為纖維之稱

大別為二、曰壯脬、曰和脬、興復凝體之衰弱、以  
作流體之健運、是謂壯脬劑也、調和凝體之強盛、

以成流體之順利、是謂和脬劑也、凝體皆成於脬、故概謂之脬也、壯脬劑分為七、功用通於諸部者、曰壯脬、見於一部者、曰壯腦、曰壯心、曰壯肺、曰健胃健腸、曰壯宮宮謂子宮是也、肝脾膀胱腎等藥、散見于諸門中、不列于此、蓋凝體弛緩則衰弱、衰弱則運動不及、其壯之必係刺戟收脬之藥、刺戟以起其機動、收固以復其實質、藥品主辛辣芳香簽味鹹味揮發走竄苦澁酸收樹脂質鑛性者、知性之所適、審質之所合、而收功於各部也、和脬劑則反於是矣、蓋凝體牽張則強盛、強盛則運動太過、

其和之、宜用涼踈輭緩之藥、涼踈以損其衝突、輭緩以柔其實質而過動和矣涼踈法見于下二門、今但舉緩和劑、藥品主粘質淡味甘味濕潤多液者、此劑諸部可通用、故不別分目、凝體諸患甚多、而不論何部何病、凡內治諸藥、無有一不由於胃腸者、憑其神經感觸之應、藉其運化消導之力、其已有如是之妙機、故亦能為一身患害之關係學者誠有悟乎斯、則治療之術已得要領、又應不恠予設健胃諸劑特多也、又催睡劑麻劑鎮痙劑等、併收名曰息神劑、附此門之後、藥品主精微塩氣有異常

刺衝性能胃奪知覺運動者、此劑似壯脤而非壯  
脤、以和脤而非和脤、然善用則保脤質之罷幣、鎮  
機動之過強、以資調脤諸劑之應驗、如誤用妄施、  
則能令強者益強弱者益弱、頃刻陷人性命、學者  
宜明辨深思焉、

### 壯脤劑第一

壯脤飲

洎製  
蘭方

機那

蘭名法列力匝那、和名春敗醬、又纈草、此物  
無漢名、蓋敗醬類、今且用和名呼之下倣之

水楊梅根

苦薏

右三味水煎、或去苦薏加龍膽、又加薄荷油開醒

|                |          |
|----------------|----------|
| 液、失勃           |          |
| 第二壯脰飲          |          |
| 原外臺唐侍<br>中療脚氣方 |          |
| 枳榔             | 木茱       |
| 桂皮             | 吳茱萸      |
| 纈草根            |          |
| 紫蘇             |          |
| 右六味、水煎、或加機那、   |          |
| 入壯心部改名強壯平劑     |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
| 機那煎            | 蘭方<br>藥鏡 |
| 機那             | 八錢       |

右一味水煎、

治熱壯胸飲

蘭方  
纂要

機那 橙皮 苦薏 精大麦 石蜜

右五味、水煎、或加纈草根、虛者加菖蒲根

兼治壯劑

原長沙腎  
氣丸料

乾地黄 薯蕷 茯苓 牡丹皮 木茱

桂皮 附子

右七味、水煎、

催膿飲

原長沙排膿湯、  
活幼參歸鹿茸湯、

白芷 防風 桔梗 人參 鹿角屑

|              |                |                                                |                 |               |              |            |                                   |            |            |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|
| <p>黃芪 甘草</p> | <p>右七味、水煎、</p> | <p>排毒壯脬飲<br/><small>原和方、<br/>稱癰藥者、</small></p> | <p>梓葉 樺皮 忍冬</p> | <p>右三味、水煎</p> | <p>丸散諸製劑</p> | <p>壯脬丸</p> | <p>黑鋼丸<br/><small>新考方</small></p> | <p>機那散</p> | <p>玫瑰浸</p> |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|

|     |     |       |        |     |       |                     |     |    |                                  |
|-----|-----|-------|--------|-----|-------|---------------------|-----|----|----------------------------------|
| 壯脬鍊 | 壯脬酎 | 右見于中編 | 玫瑰花舍利別 | 鐵屑酎 | 桂皮酎及露 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 外施方 | 灸灼 | <p>浴法</p> <p>海水 鹹<br/>泉 鐵氣 泉</p> |
|-----|-----|-------|--------|-----|-------|---------------------|-----|----|----------------------------------|

|     |        |      |       |       |        |     |     |     |     |
|-----|--------|------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 機那浸 | 熊膽丸    | 赤葡萄酒 | 應通用諸方 | 右見于下編 | 外治強壯諸方 | 刺戟糊 | 發泡膏 | 冷湯法 | 灌水法 |
| 全上  | 苦味健胃諸劑 | 壯心部  |       |       |        |     |     |     |     |

底野迦

急神部

壯腦劑第二

壯神經劑同

壯腦飲

自製方

苦薏 纈草根

麝草

伊吹者

泥菖蒲根

右四味、水煎、後急者加附子

鮮  
泐  
壯  
腦  
飲

原局方烏  
藥順氣散

烏藥 紫蘇 羌活 芎藭 苦薏

續草根

右六味、水煎、

制苛壯腦飲

原寶鑑沈  
香天麻湯

殭蚕  
 天麻  
 葛根  
 續草根  
 防風

羌活

右六味、水煎、或加沈香烏頭、

|                            |                          |             |                                |                   |                        |                           |                  |                      |                                           |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <p>通腦飲</p> <p>原局方川芎茶調散</p> | <p>荊艾 羌活 芎藭 續草 苦薏 薄荷</p> | <p>雨前茶芽</p> | <p>右七味、上五味、麻沸湯煮五六沸、入下二味下火、</p> | <p>一盞茶時、去滓頓服、</p> | <p>洎夫藍飲</p> <p>依百方</p> | <p>洎夫藍</p> <p>一分五厘至五分</p> | <p>右一味、溫湯浸用、</p> | <p>通腦液</p> <p>蘭方</p> | <p>葛越布<sup>カエブーテ</sup>的</p> <p>三滴至十五滴</p> |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------|

|                        |              |           |                                             |            |            |            |            |              |              |
|------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| <p>右一味、加石蜜和勻、白湯送下、</p> | <p>丸散諸製劑</p> | <p>紫雪</p> | <p>右見于丸散方<br/><small>辛未歲所著、下倣之、</small></p> | <p>麝香丸</p> | <p>龍腦散</p> | <p>石龍散</p> | <p>刺衝液</p> | <p>鎮痙壯腦液</p> | <p>右見于中編</p> |
|------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|

|             |                                       |     |     |       |                     |     |     |      |      |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|---------------------|-----|-----|------|------|
| 揮發液<br>即硃砂精 | 開醒液<br>即忽布滿鎮痛液<br><small>ホフマン</small> | 鹿角精 | 鹿角塩 | 琥珀油及塩 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 外施方 | 揮發塩 | 醒神擦劑 | 硃精擦劑 |
|-------------|---------------------------------------|-----|-----|-------|---------------------|-----|-----|------|------|

|     |       |                   |             |             |       |       |            |              |  |
|-----|-------|-------------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|--|
| 烟草耐 | 備急注腸劑 | 刺戟膏<br>即發泡膏亭長化膿膏類 | 吹烟方<br>即薰腸法 | 發噎方<br>即誘噎散 | 右見于下編 | 應通用諸方 | 礬桂耐<br>健胃部 | 非割土嗅水<br>壯宮部 |  |
|-----|-------|-------------------|-------------|-------------|-------|-------|------------|--------------|--|

壯心劑第三

壯心飲

原薛氏  
獨參湯

人參 乾姜

右二味、水煎、或加桂皮、

第二壯心飲

原長沙  
四逆湯

人參 附子 乾姜 甘草

右四味、水煎、

制苛壯心飲

原長沙  
真武湯

茯苓 蒼朮 芍藥 人參 附子

右五味、水煎、

|           |  |              |  |     |  |     |  |
|-----------|--|--------------|--|-----|--|-----|--|
| 強壯飲       |  | 自製方          |  |     |  |     |  |
| 桂皮        |  | 人參           |  | 水楊梅 |  | 薄荷  |  |
|           |  |              |  |     |  | 纈草根 |  |
| 右五味、水煎、   |  |              |  |     |  |     |  |
| 強壯平劑      |  | 原長沙黃<br>芪建中湯 |  |     |  |     |  |
| 桂皮        |  | 人參           |  | 黃芪  |  | 芍藥  |  |
| 右四味、生姜水煎、 |  |              |  |     |  |     |  |
| 製劑        |  |              |  |     |  |     |  |
| 洎夫藍酒      |  |              |  |     |  |     |  |
| 右見于中編     |  |              |  |     |  |     |  |
| 赤葡萄酒      |  |              |  |     |  |     |  |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 |                 |
| 應通用諸方               |                 |
| 泊夫藍飲                | 壯腦部             |
| 麝香丸                 | 全上              |
| 礬桂酎                 | 健胃部             |
| 壯肺劑第四               |                 |
| 壯肺飲                 | 原蘭方<br>依百       |
| 依蘭苔 <sup>エーラン</sup> | 蜀羊泉莖 甘草 欵冬葉 小連翹 |
| 右五味、沸湯煮二三沸、用、       |                 |

|                                              |               |                            |              |              |            |              |            |            |            |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| <p>第二壯肺飲</p> <p><small>蘭方<br/>依百</small></p> | <p>依蘭苔 機那</p> | <p>右二味、水煎、加蜀葵舍利別八錢、分服、</p> | <p>丸劑諸製劑</p> | <p>壯肺興復丸</p> | <p>乳沒丸</p> | <p>壯肺利胸丸</p> | <p>黃龍散</p> | <p>安息鍊</p> | <p>硫花糕</p> |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|

|              |            |             |              |              |                                |                               |                               |                              |                                    |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <p>右見于中編</p> | <p>外施方</p> | <p>壯肺薰劑</p> | <p>右見于下編</p> | <p>應通用諸方</p> | <p>洎夫藍飲 <small>壯腦部</small></p> | <p>水玉糕 <small>鮮凝部</small></p> | <p>黃石丸 <small>發汗部</small></p> | <p>黃龍散 <small>全上</small></p> | <p>健胃健腸劑第五 <small>驅風劑附</small></p> |
|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|

|                                                 |  |                           |                |                                                                                                                        |                          |                                                                 |                                                 |                        |           |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| <p>健化飲</p> <p><small>自製方又局<br/>方安中散</small></p> |  | <p>龍膽 陳皮 桂皮 良姜 薄荷 煨鹿角</p> | <p>右六味、水煎、</p> | <p>第二健化飲</p> <p><small>原長沙桂枝人參湯、外臺下利方稱家<br/>方茯苓白朮湯者、得効六君子湯、局<br/>方平胃散、脾胃半夏白朮天麻湯、寶鑑當<br/>歸四逆湯、直訣七味白朮散、赤水壯原湯</small></p> | <p>半夏 茯苓 陳皮 蒼朮 桂皮 乾姜</p> | <p>右六味、水煎、</p> <p><small>欲取所疏各方之切者宜就<br/>原方中擇一二味加減用</small></p> | <p>第三健化飲</p> <p><small>原濟生大<br/>七氣湯</small></p> | <p>莪朮 陳皮 桂皮 香附子 益智</p> | <p>枳榔</p> |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|

右六味、水煎、

第四健化飲

自製方

龍膽 蒲公英 香附子 半夏 陳皮

右五味水煎痢疾吐下後加鹿角屑茯苓垂刺比垂趨謨若欠則以椿膠或朮膠代之類調理之或去龍膽蒲公英加

木香虛甚加

人參附子

第五健化飲

原長沙半夏瀉心湯黃連湯

半夏 黃連 黃芩 乾姜 桂皮

右五味、水煎、

第六健化飲

自製方

野艾蒿 纈草 鹿角灰 橙皮

右四味、生姜水煎、

第七健化飲

自製方

機那 肉豆蔻 鹿角灰 桂皮

右四味、生姜水煎、

第八健化飲

自製方又局  
方雞舌香散

薄荷 麝草 烏藥 桂皮 良姜 羌活

右六味、水煎或加菖蒲根、

單方健化飲

自製方

薄荷 龍膽 杜松子

右三味、水煎、

靖胃飲

原長沙小半  
夏加茯苓湯

半夏 茯苓 椒

右三味、生姜水煎、

祛痰健化飲

原外臺活  
瘀癖咳方

吳茱萸 細辛 乾姜 半夏 蒼朮 鼈甲

右六味、水煎具母馬兜鈴天南星竹茹類隨時去加用

第二祛痰健化飲

原蘭方  
武郎

白芷 木香 乾姜 小茴香 連錢草

右五味、水煎、小兒加甘草、

褪黃健化飲

自製方

|              |         |         |            |         |       |     |     |     |     |
|--------------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 龍膽 薄荷 蒲公英 茜根 | 右四味、水煎、 | 健腸飲 自製方 | 苦薏 鹿角屑 精大麥 | 右三味、水煎、 | 丸散諸製劑 | 千金丸 | 黑丸子 | 左金丸 | 神異丹 |
|--------------|---------|---------|------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|

|     |     |         |     |       |     |       |     |     |     |
|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 健胃散 | 申眉散 | 右見于丸散方府 | 健化丸 | 第二健化丸 | 熊膽丸 | 第二健胃散 | 健胃酒 | 回春酒 | 健胃耐 |
|-----|-----|---------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|

|     |                     |      |       |     |       |       |     |     |     |
|-----|---------------------|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|
| 外施方 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 龍膽熬膏 | 右見于中編 | 機那浸 | 祛痰健化糕 | 第二鎮嘔液 | 鎮嘔液 | 健胃液 | 礬桂酎 |
|-----|---------------------|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|

|      |      |                                          |       |       |                           |                          |                            |                          |                           |
|------|------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 扶胃枕子 | 健胃擦劑 | 滋養注腸劑<br><small>与本門諸劑意<br/>少異而大同</small> | 右見于下編 | 應通用諸方 | 黒鋼丸<br><small>壯脘部</small> | 壯脘酹<br><small>全上</small> | 洎夫藍飲<br><small>壯腦部</small> | 刺衝液<br><small>全上</small> | 阿魏丸<br><small>鮮凝部</small> |
|------|------|------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|

|                      |                      |             |                       |  |             |                              |                     |              |                  |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| <p>礶砂糕</p> <p>全上</p> | <p>水玉糕</p> <p>全上</p> | <p>克酸諸劑</p> | <p>石鹼丸</p> <p>瀉下部</p> |  | <p>附驅風劑</p> | <p>驅風飲</p> <p>原蘭方<br/>我爾</p> | <p>小茴香 橙皮 薄荷 梔子</p> | <p>栗殼舍利別</p> | <p>右五味、生姜水煎、</p> |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------|

|                                 |                        |                  |                                       |                    |                 |                |            |            |              |
|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|
| <p>第二驅風飲</p> <p>原家方<br/>神消湯</p> | <p>檳榔 枳殼 益智 小茴香 梔子</p> | <p>右五味、生姜水煎、</p> | <p>第三驅風飲</p> <p>原局方三和散<br/>鑑行氣香蘇散</p> | <p>木香 橙皮 纈草 羌活</p> | <p>紫蘇 檳榔 蒼朮</p> | <p>右七味、水煎、</p> | <p>諸製劑</p> | <p>消風液</p> | <p>右見于中編</p> |
|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------|--------------|

|                        |               |                            |            |           |            |              |              |                       |                      |
|------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| <p>消疝露</p> <p>即驅風精</p> | <p>小茴香露及油</p> | <p>右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、</p> | <p>外施方</p> | <p>蒸劑</p> | <p>注腸劑</p> | <p>右見于下編</p> | <p>應通用諸方</p> | <p>刺衝液</p> <p>壯腦部</p> | <p>開醒液</p> <p>全上</p> |
|------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|

|                        |                       |              |                              |                      |                |                                |                    |                                                                    |                                |
|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>驅風湯劑</p> <p>瀉下部</p> | <p>驅風下丸</p> <p>全上</p> | <p>壯宮劑第六</p> | <p>壯宮飲</p> <p>原蘭方<br/>六物</p> | <p>落葉松耳 苦薏 乾姜 石蜜</p> | <p>右四味、水煎、</p> | <p>第二壯宮飲</p> <p>原蘭方<br/>布飲</p> | <p>桂皮 丁香 苦薏 茅根</p> | <p>右四味、水煎、</p> <p>原、用耐劑舍利<br/>別等、無茅根、</p> <p>或加寄生</p> <p>崩下者、加</p> | <p>枯礬阿片、今或加麝草又加依蘭苔、療白帶下虛症、</p> |
|------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|      |     |       |       |     |         |                                    |        |       |       |
|------|-----|-------|-------|-----|---------|------------------------------------|--------|-------|-------|
| 丸劑製劑 | 壯宮丸 | 鎮瘧壯宮液 | 右見于中編 | 外施方 | 子宮衝逆嗅氣劑 | 非割土嗅水<br><small>フイカ<br/>ット</small> | 子宮衝逆薰法 | 右見于下編 | 應通用諸方 |
|------|-----|-------|-------|-----|---------|------------------------------------|--------|-------|-------|

|                                 |              |  |                      |                      |                        |                         |                       |                       |                        |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <p>緩和飲</p> <p>即長沙芍<br/>藥甘草湯</p> | <p>緩和劑第七</p> |  | <p>通經丸</p> <p>全上</p> | <p>通經飲</p> <p>全上</p> | <p>制苛解泐飲</p> <p>全上</p> | <p>第三解泐飲</p> <p>解凝部</p> | <p>阿魏酎</p> <p>息神部</p> | <p>礬桂酎</p> <p>健胃部</p> | <p>泊夫藍飲</p> <p>壯腦部</p> |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|

芍藥 甘草

右二味、水煎、

第二緩和飲

自製方

錦葵葉 精大麦 甘艸

右三味、水煎、

第三緩和飲

原三因  
杏參散

杏仁 朮仁 栳白皮

右三味、水煎、

和胸飲

自製方 又  
長沙桔梗湯

錦葵葉 蜀葵根 桔梗 欵冬葉 甘草

|                                                 |                 |                                   |                          |                |                                       |                            |                                  |                                             |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>右五味、水煎、或加𤣥刺比𤣥膠<small>欠則以椿膠代之</small>石長生類</p> | <p>咳甚者、加罌粟子</p> | <p>第二和胸飲 <small>原蘭方失勃</small></p> | <p>蜀葵根 錦葵根 無花果 甘草 硝石</p> | <p>右五味、水煎、</p> | <p>第三和胸飲 <small>自製方又長沙葦莖湯</small></p> | <p>栝白皮 桔梗 薏苡 瓜子 生地黄 甘草</p> | <p>右六味、水煎、或加硝石、或加羚羊角竹茹、或用生葦莖</p> | <p>生薏苡根類 <small>即家方羚羊生地黃湯原好臺無名方</small></p> | <p>利胸飲 <small>原長沙麥門冬湯</small></p> |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|

|                            |                  |                                     |                       |                |                                     |                  |                |                                  |                                             |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>麥門冬 精大麥 杏仁 半夏 陳皮 紫蘇</p> | <p>右六味、生姜水煎、</p> | <p>第二利胸飲 <small>原長沙麻杏甘湯</small></p> | <p>杏仁 甘草 石膏 麻黃 紫蘇</p> | <p>右五味、水煎、</p> | <p>常用和劑 <small>原長沙甘麥大棗湯</small></p> | <p>茅根 精大麥 大棗</p> | <p>右三味、水煎、</p> | <p>利咽緩和飲 <small>蘭方失勃</small></p> | <p>茅根 鹿角屑 粘魚鬚 <small>無、則代菝葜、</small> 甘草</p> |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|

|              |                |                                        |                   |                |                                               |                       |                                                 |                              |                            |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <p>紫蘇 薄苛</p> | <p>右六味、水煎、</p> | <p>遏濫和劑 <small>原蘭方<br/>華 拳</small></p> | <p>鹿角菜 生地黄 甘草</p> | <p>右三味、水煎、</p> | <p>治淋緩和飲 <small>蘭方 原我<br/>爾 又 布 歛</small></p> | <p>精大麦 蜀葵根 麗春花 甘草</p> | <p>右四味、水煎、鮮石加蠣灰水 <small>方与石<br/>灰水同</small></p> | <p>餌湮方 <small>蘭方</small></p> | <p>羊乳加砂糖、或健婦乳汁、一日服一二合、</p> |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

|     |     |     |    |       |       |        |         |      |                     |
|-----|-----|-----|----|-------|-------|--------|---------|------|---------------------|
| 諸製劑 | 滋肺漿 | 御米湮 | 卵湯 | 右見于中編 | 蜀葵舍利別 | 石長生舍利別 | 複方栗殼舍利別 | 甘草熬膏 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 |
|-----|-----|-----|----|-------|-------|--------|---------|------|---------------------|

|     |    |    |        |       |       |                           |                           |      |                             |
|-----|----|----|--------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
| 外施方 | 蒸劑 | 浴法 | 外治緩和諸方 | 右見于下編 | 應通用諸方 | 硫華糕<br><small>壯肺部</small> | 息神糕<br><small>息神部</small> | 清潤諸劑 | 第二達腴飲<br><small>發汗部</small> |
|-----|----|----|--------|-------|-------|---------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|

|                       |                        |                        |  |             |                               |           |                  |                       |               |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------|
| <p>緩下劑</p> <p>瀉下部</p> | <p>甘硝石精</p> <p>利尿部</p> | <p>刺絡法</p> <p>下編附錄</p> |  | <p>附息神劑</p> | <p>奪知飲</p> <p>即長沙<br/>烏頭煎</p> | <p>烏頭</p> | <p>右一味、好蜜濃煎、</p> | <p>鎮痙飲</p> <p>自製方</p> | <p>槲寄生 茜根</p> |
|-----------------------|------------------------|------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|---------------|

右二味、水煎、

清涼鎮瘧飲

蘭方  
失効

芒硝

八錢

比玉石藥莫私

五厘

寔吉打力思

一錢

右三味、以水九十六錢、煮些時、每用一匕、

丸劑諸製劑

芙蓉丸

第二芙蓉丸

鎮瘧阿魏丸

鎮狂丸

|     |     |     |       |     |                              |      |                     |     |       |
|-----|-----|-----|-------|-----|------------------------------|------|---------------------|-----|-------|
| 底野迦 | 息神液 | 麻沸酒 | 右見于中編 | 阿魏酎 | 息神糕<br><small>即粟殼舍利別</small> | 烏頭熬膏 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 外施方 | 息神注腸劑 |
|-----|-----|-----|-------|-----|------------------------------|------|---------------------|-----|-------|

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 右見于下編         |                  |
| 應通用諸方         |                  |
| 御米漚           | 緩和部              |
| 治淋緩和飲         | 全上               |
| 附異用同功、鎮痙鎮痛諸劑、 | 興本門諸方、混一繆用、誤人不解、 |
| 泊夫藍浸          | 壯腦見<br>于本門       |
| 麝香丸           | 全上               |
| 鎮痙壯腦液         | 全上               |
| 開醒液           | 全上               |
| 甘硝石精          | 全上見<br>于利尿部      |

|                                      |                                     |                                     |                                       |                                      |                                       |                                      |                                    |                                    |                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 鎮瘧壯宮液<br><small>壯宮 見<br/>于本門</small> | 礬桂酎<br><small>全上 見<br/>于健胃部</small> | 阿魏丸<br><small>全上 見<br/>于解凝部</small> | 子宮衝逆薰劑<br><small>全上 見<br/>于下編</small> | 跋烏血<br><small>清涼 見于<br/>丸散方府</small> | 龍腦醋乙方<br><small>全上 見<br/>于發汗部</small> | 了々丸<br><small>克酸 見于<br/>丸散方府</small> | 紅玉屑<br><small>克酸 見<br/>于本門</small> | 鉛華散<br><small>全上 見<br/>于本門</small> | 究理堂備用方府上編卷之一<br><small>畢</small> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

究理堂備用方府上編卷之二

平安小石龍元瑞父 編撰

河内柘 熙 君績 参訂

大坂斎藤端 履侯 仝校

周防南部安貞元吉 仝校

調血諸劑

調理流體之失常者、以復凝體之罷弊、是謂調血劑也、流體諸物、皆資於血、故概謂之血也、其失常者、大別有二、曰運行大過、曰運行不及、大過者、則

沸騰煎熬、濃厚、腐敗及者、則壅滯粘凝、酸敗、**變壞**、**烱鮮**謂、稀涼酷厲是也、其救沸騰煎熬濃厚者、名曰清潤、藥品主甘味**粘質**潤性酸味石鹼質者**中和**塩者、以瀉下劑助之、救腐敗、名曰救敗、藥品主酸味澁味苦味者、而清涼諸品助之、救壅滯粘凝者、名曰鮮凝藥品主辛味苦味芳香刺戟性者、救酸敗者、名曰克酸、藥品主土質吸收性灰塩者、以健胃諸劑配之、救**變壞烱鮮**及失調者、名曰復良、藥品主苦味澁味**酸味**樹脂質者以**溫性**及**健胃**諸

品助之 稀涼酷厲、則諸液變壞之極、  
多為難治、今且舉示一端、名曰淳化、藥品主  
膠質粘質品中配收斂強壯藥者、他須求于復良  
或壯肺劑中、蠱毒之治附于解凝劑後其他諸毒  
及膽液諸患類宜隨其性求于各門中而療之且  
清潤之藥、無緩和、解凝之劑常帶刺戟、皆是流  
體之藥、而治涉于凝體者、何也、蓋凝流二體、一而二、  
二而一、故凝體失常、多原於流體之變、  
流體變動、常因於凝體之故、是以其為治法、亦互  
相濟而成其功也、夫立門分類者、但範之初學、

學者於二體、已曉其異而知其同、則三門而一致矣、已通其同而明其異、則一致而十七目矣、而後謂之真得也、復良部飲劑多主紫胡黃芩者是係予私考、如其說、則面質之可矣

### 清潤劑第一

清潤飲

自製方

大麥 乾葡萄 硝石 石蜜

右四味、水煎、乾葡萄或代酸模根

清煖飲

自製方

精大麥 蜀葵根 甘草 硝石

|                |                        |                 |                |                               |                   |                |                               |                |                |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <p>右四味、水煎、</p> | <p>治熱平劑</p> <p>自製方</p> | <p>大麦 橙皮 石蜜</p> | <p>右三味、水煎、</p> | <p>制鰾飲</p> <p>原長沙<br/>白帟湯</p> | <p>石膏 括蕒根 精大麦</p> | <p>右三味、水煎、</p> | <p>生津飲</p> <p>原辨惑<br/>生脉散</p> | <p>麥門冬 五味子</p> | <p>右二味、水煎、</p> |
|----------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|

|                                             |               |                 |                                             |                                      |                                                      |                                  |            |            |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| <p>梅肉湯</p> <p><small>原蘭方<br/>蒲剛</small></p> | <p>梅肉汁舍利別</p> | <p>右一味、湯和用、</p> | <p>大麥煎</p> <p><small>原蘭方<br/>藥鏡</small></p> | <p>精大麥</p> <p><small>十六錢</small></p> | <p>右冷水洗淨、以水八十錢、煮一二沸傾去濁汁、再入沸湯八百錢、煮減半、取汁、或加橙汁用、加涼蜜</p> | <p>亦可、<br/><small>我爾</small></p> | <p>諸製劑</p> | <p>清潤漿</p> |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|

|     |       |    |       |         |         |        |       |                     |     |
|-----|-------|----|-------|---------|---------|--------|-------|---------------------|-----|
| 潤燥漿 | 第二潤燥漿 | 涼蜜 | 右見于中編 | 回青橙汁舍利別 | 沸手柑瓢舍利別 | 覆盆子舍利別 | 栞甚舍利別 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 外施方 |
|-----|-------|----|-------|---------|---------|--------|-------|---------------------|-----|

|                                 |
|---------------------------------|
| 清<br>熨<br>和<br>痛<br>劑           |
| 第<br>二<br>清<br>熨<br>和<br>痛<br>劑 |
| 蔓<br>菁<br>糊                     |
| 通<br>腦<br>擦<br>劑                |
| 脚<br>湯<br><small>兼用刺戟糊</small>  |
| 清<br>潤<br>注<br>腸<br>劑           |
| 刺<br>絡                          |
| 蜚<br>鍼                          |
| 右見于下編                           |
| 應<br>通<br>用<br>諸<br>方           |

|                         |                       |                        |                        |                        |                         |                        |  |              |                       |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|-----------------------|
| <p>強壯清涼液</p> <p>救敗部</p> | <p>龍腦醋</p> <p>發汁部</p> | <p>乙方龍腦醋</p> <p>全上</p> | <p>爽涼湧劑</p> <p>湧吐部</p> | <p>清涼盪劑</p> <p>瀉下部</p> | <p>第二清涼盪劑</p> <p>全上</p> | <p>甘硝石精</p> <p>利尿部</p> |  | <p>救敗劑第二</p> | <p>救敗飲</p> <p>自製方</p> |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------|-----------------------|

|                     |                         |                                        |                   |                       |                                 |                            |                        |                               |                     |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <p>機那 橙皮 乾葡萄 大麥</p> | <p>右四味、水煎、或加硫黃精石蜜服、</p> | <p>第二救敗飲 <small>原蘭方<br/>我爾</small></p> | <p>玫瑰花 大麥 乾葡萄</p> | <p>右三味、水煎、熱甚者加硝石、</p> | <p>壯神救敗飲 <small>自製方</small></p> | <p>機那 菖蒲根 乾葡萄 龍腦 大麥 石蜜</p> | <p>右六味、水煎、湯成入龍腦、石蜜</p> | <p>清暑飲 <small>自製方</small></p> | <p>乾葡萄 大麥 麝草 橙皮</p> |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|

|                   |             |                  |                                                        |            |                            |            |           |              |              |
|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| <p>右四味水煎湯成加砂糖</p> | <p>散劑製劑</p> | <p>泥菖散 右見于中編</p> | <p>強壯清涼液 即 赭篤立沃爾亞的兒<br/><small>ヒツトリテイルアーテル</small></p> | <p>葡萄酒</p> | <p>右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、</p> | <p>外施方</p> | <p>刺絡</p> | <p>右見于下編</p> | <p>應通用諸方</p> |
|-------------------|-------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|

|                       |              |                       |                        |                        |                       |  |                          |                       |                                                     |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>梅肉湯</p> <p>清潤部</p> | <p>清潤諸製劑</p> | <p>復良飲</p> <p>復良部</p> | <p>第二復良飲</p> <p>全上</p> | <p>清涼盪劑</p> <p>瀉下部</p> | <p>救敗盪劑</p> <p>全上</p> |  | <p>鮮凝劑第三</p> <p>蠲微劑附</p> | <p>鮮泐飲</p> <p>自製方</p> | <p>槐心黑木</p> <p>茅根</p> <p>桂皮</p> <p>羌活</p> <p>龍膽</p> |
|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|

雷遺塩

右六味、水煎、

第二鮮泐飲

自製方 又局  
方蘓子降氣湯

桂皮 紫蘓 羌活 蒲公英 杜松子

陳皮

右六味、生姜水煎、

第三鮮泐飲

原蘭方  
我爾

野艾蒿 龍膽 杜松子 雷遺塩

右四味、水煎、

第四鮮泐飲

原長沙桂枝茯苓  
丸產論於衝飲

|                        |                |                                               |                        |           |                |                                     |                  |                  |                                               |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <p>桂皮 烏藥 牡丹皮 羌活 樅仁</p> | <p>右五味、水煎、</p> | <p>壯心解泐飲<br/><small>原入門正<br/>氣天香湯</small></p> | <p>烏藥 紫蘇 香附子 陳皮 桂皮</p> | <p>乾姜</p> | <p>右六味、水煎、</p> | <p>利咽解泐飲<br/><small>自製方</small></p> | <p>紫蘇 射干 山豆根</p> | <p>右三味、生姜水煎、</p> | <p>制苛解泐飲<br/><small>原濟生紫<br/>蘇和氣飲</small></p> |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <p>紫蘇 陳皮 芎藭 香附子 枳櫚</p>                                   |
| <p>當歸 芍藥</p>                                             |
| <p>右七味、水煎、或去枳櫚加茜根、</p>                                   |
| <p>復良鮮泐飲 <small>自製方</small></p>                          |
| <p>蘼木 桂皮 芍藥 柴胡 黃芩</p>                                    |
| <p>右五味、水煎、</p>                                           |
| <p>溶釋飲 <small>自製方</small></p>                            |
| <p>失鳩荅 <small>シキウダ 代用 荳蔻 無 則 芹 葉 鈎 吻</small> 蒲公英 括藹仁</p> |
| <p>薏苡仁 甘草</p>                                            |
| <p>右五味、水煎、</p>                                           |

第二溶釋飲

自製方

牛皮消 薏苡仁 甘草

右三味、水煎、

疎肝飲

自製方

蜀羊泉莖 蒲公英 茜根

右三味、水煎、

通經飲

自製方

薄荷 白芷 茜根 山奈 龍膽

右五味、水煎、

硫黃泉

原蘭方  
依百

泉飲之、及濯浴之、  
詳于下編洗劑部

丸劑諸製劑

稀涎丸

右見于丸散方府

阿魏丸

乙方阿魏丸

玉蟾丸

通經丸

礞砂糕

水玉糕

|     |       |                                         |       |                    |     |       |      |     |       |
|-----|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------|-----|-------|------|-----|-------|
| 焯菜酒 | 右見于中編 | 雷遺塩 即 <small>サルボレークレスト</small> 撒兒剥禮傑列私篤 | 蒲公英熬膏 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘 | 外施方 | 琥珀油擦劑 | 硃精擦劑 | 發泡膏 | 亭長化膿膏 |
|-----|-------|-----------------------------------------|-------|--------------------|-----|-------|------|-----|-------|

|    |        |       |       |           |             |           |           |              |            |
|----|--------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| 刺絡 | 外治鮮凝諸方 | 右見于下編 | 應通用諸方 | 灸灼<br>壯脰部 | 洎夫藍飲<br>壯腦部 | 麝香丸<br>全上 | 刺衝液<br>全上 | 壯肺利胸丸<br>壯肺部 | 換胎丸<br>蠲微部 |
|----|--------|-------|-------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|

|                      |                         |                        |                      |                      |                       |  |            |                              |                                                      |
|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>碧龍散</p> <p>全上</p> | <p>鮮泐達腩飲</p> <p>發汁部</p> | <p>鮮泐盪劑</p> <p>瀉下部</p> | <p>石驗丸</p> <p>全上</p> | <p>快丸子</p> <p>全上</p> | <p>溶釋下散</p> <p>全上</p> |  | <p>附蠲劑</p> | <p>鮮泐蠲飲</p> <p>原方<br/>布飲</p> | <p>剥骨何突</p> <p>代用槐<br/>心黒木</p> <p>茅根</p> <p>蜀羊泉莖</p> |
|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------------------------------|

右三味、水煎、

第二鮮泐蠲黴飲

蘭方  
伝百

瑞香皮 遺糧 山牛蒡根 甘草

右四味、水煎、或加蜀羊泉莖

遺糧飲

原蘭方  
布 斂

仙遺糧

二十  
四錢

右一味、以水二百四十錢、煮取百九十二錢一日服盡、

藥木飲

原蘭方  
布 斂

仙遺糧 槐心黒木 紫檀 薩撒弗刺斯

甘草

右五味、水煎、

原方有銆石、搥計九味、今略為五味、宜併考、

和毒飲

原蘭方  
布歛

仙遺糧

茅根

山牛蒡根

右三味、水煎、

附涪製竒良方

家方

仙遺糧

三斤

雌雞

一隻去羽毛  
藏府洗淨

右二味、先以雞肉、和骨切細、以水六升、煮取四升、

去滓稍冷、以竒良浸些時、瀝汁曝乾、再浸至涪盡、

一日十五錢、至二十錢、以水八合或一升、煮減四

分之一服、或取一二錢、加飲劑中服、亦可、

|      |     |         |            |     |     |     |       |     |      |
|------|-----|---------|------------|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 丸散製劑 | 驅壞丸 | 右見于丸散方府 | 換胎丸<br>新考方 | 一氣丸 | 碧龍散 | 蠲蠲酖 | 右見于中編 | 外施方 | 下疳蒸劑 |
|------|-----|---------|------------|-----|-----|-----|-------|-----|------|

|       |    |       |       |     |     |     |     |     |      |
|-------|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 愈瘡猛汞酹 | 諸膏 | 第三誘嚏散 | 第二蠲嗽劑 | 蠲嗽劑 | 奇汞水 | 金汞水 | 蚌殼水 | 石灰水 | 吐涎擦劑 |
|-------|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

|             |             |           |            |              |       |       |    |    |    |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------|-------|----|----|----|
| 內服蚌殼水<br>全上 | 內服石灰水<br>全上 | 瓊蚌散<br>全上 | 鍊石散<br>克酸部 | 治淋緩和飲<br>緩和部 | 應取用諸方 | 右見于下編 | 蜚針 | 烟劑 | 薰劑 |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------|-------|----|----|----|

|  |       |      |     |     |     |     |     |       |         |
|--|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|
|  | 克酸劑第四 | 丸散製劑 | 救奇散 | 鍊石散 | 瓊蚌散 | 紅玉屑 | 混沌散 | 諸動物燒灰 | 右見于丸散方府 |
|--|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------|

|     |      |        |     |     |     |       |           |           |               |
|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|---------------|
| 活骨丸 | 克酸瀉散 | 乙方克酸瀉散 | 碧雪散 | 鉛華散 | 救急子 | 右見于中編 | 石灰水<br>内服 | 蚌殼水<br>内服 | 右見于下編、服法見于中編、 |
|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|-----------|-----------|---------------|

|       |     |
|-------|-----|
| 應通用諸方 |     |
| 鹿角精及塩 | 壯腦部 |
| 健胃諸劑  |     |
| 礪砂糕   | 鮮凝部 |
| 單味底野迦 | 復良部 |
| 滋養羹及灸 | 全上  |
| 石鹼丸   | 瀉下部 |
| 復良劑第五 |     |
| 復良飲   |     |
| 自製方   |     |

|         |    |          |     |     |
|---------|----|----------|-----|-----|
| 機那      |    | 桂皮       | 水楊梅 | 乾葡萄 |
| 右四味、水煎、 |    |          |     |     |
| 第二復良飲   |    | 自製方      |     |     |
| 玫瑰花     |    | 乾葡萄      | 菖蒲根 | 麝草  |
| 右四味、水煎、 |    |          |     |     |
| 復良平劑    |    | 原長沙小柴胡湯  |     |     |
| 柴胡      |    | 黃芩       | 香附  | 蒼朮  |
| 右四味、    |    | 生姜水煎、    |     |     |
| 強壯復良平劑  |    | 原東垣補中益氣湯 |     |     |
| 柴胡      | 陳皮 | 蒼朮       | 人參  | 升麻  |
|         |    |          | 黃芪  |     |

右六味、生姜水煎、

健胃復良飲

原長沙柴  
胡姜桂湯

柴胡 黃芩 陳皮 桂皮 乾姜 煨鹿角

右六味、水煎、

第二健胃復良平劑

自製方

於後良平劑方中加龍膽杜松子

啞科復良飲

即小兒中  
暑經驗方

柴胡 黃芩 黃連 姜活 蒼朮 芍藥

甘草

右七味、生姜水煎、

|                               |                        |              |                  |              |            |             |                |              |             |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| <p>維持飲</p> <p>原指掌<br/>八物湯</p> | <p>當歸 芍藥 乾地黄 人參 芎藭</p> | <p>蒼朮 茯苓</p> | <p>右七味、生姜水煎、</p> | <p>丸散諸製劑</p> | <p>興復丸</p> | <p>興復神丹</p> | <p>右見于丸散方府</p> | <p>興復熊膽丸</p> | <p>機那諸劑</p> |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------|-------------|----------------|--------------|-------------|

|     |     |       |     |                          |     |     |       |                   |       |
|-----|-----|-------|-----|--------------------------|-----|-----|-------|-------------------|-------|
| 鐵諸劑 | 玫瑰酏 | 壞血病諸劑 | 葡萄酒 | 單味底野迦<br>以下四方与本門諸劑意少異姑併錄 | 滋養涪 | 滋養糕 | 滋養羹及灸 | 右主治服法見于中編製法見于製藥帳秘 | 應通用諸方 |
|-----|-----|-------|-----|--------------------------|-----|-----|-------|-------------------|-------|

|         |  |                     |  |
|---------|--|---------------------|--|
| 壯肺興復丸   |  | 壯肺部                 |  |
| 健胃諸劑    |  |                     |  |
| 淳化劑第六   |  |                     |  |
| 淳化飲     |  | 自製方                 |  |
| 麥門冬     |  | 精大麥                 |  |
| 右五味、水煎、 |  | 阿膠                  |  |
|         |  | 甘草                  |  |
|         |  | 機那                  |  |
| 第二淳化飲   |  | 自製方                 |  |
| 鼈甲      |  | 亞刺比亞膠               |  |
|         |  | 代用椿樹膠<br>無則用<br>無則用 |  |
|         |  | 生地黄                 |  |
| 麥門冬     |  | 桔梗                  |  |

|                |           |            |              |              |                                   |                                 |             |             |                                          |
|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|
| <p>右五味、水煎、</p> | <p>丸劑</p> | <p>雪蠶蛻</p> | <p>右見于中編</p> | <p>應通用諸方</p> | <p>餌湮法<br/><small>緩和部</small></p> | <p>卵湯<br/><small>全上</small></p> | <p>復良諸劑</p> | <p>壯肺諸劑</p> | <p>究理堂備用方府上編卷之二<br/><small>畢</small></p> |
|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|

究理堂備用方府上編卷之三

平安小石龍元瑞父 編撰

河内柘 熙 君績 参訂

大坂斎藤端 履侯 仝校

周防南部安貞元吉 仝校

疎利諸劑

疎利劑分為四、曰發汗、曰湧吐、曰瀉下、曰利尿是也、發汗藥品、主芳香辛味、或緩和或息神能散渙血液緩縱脉管者、湧吐藥品、

|                                                |                                                         |                              |                             |                              |                                                         |                               |                               |                             |                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| <p>者今借為、<br/>鹹渣之稱、<br/>四者主功各別、<br/>而皆兼有調脬調</p> | <p>和主甘味淡味而石鹼性者制鹹性者、<br/><small>鹹古斬切、鹽煎煉、味取下</small></p> | <p>者、鮮凝主辛味苦味芳香而刺戟者石鹼性者、緩</p> | <p>諸藥屬焉、強壯主苦味辛味芳香而收斂者刺戟</p> | <p>衝也、利尿藥品、有強壯鮮凝緩和之別、而開發</p> | <p>為滑下融下泄下、<br/><small>泄下、有緩者有峻者</small>、蓋潤滑也、稀釋也、刺</p> | <p>刺衝力者、刺衝性而能鼓動腸質者、而捻而別之、</p> | <p>質而具刺戟性者、塩質者、蜜質者、酸味而具塩氣</p> | <p>刺戟衝動性能速感於胃者、瀉下藥品、主脂油</p> | <p>主苦味辛味塩質鑛性、有異常</p> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|

血二門之用、要取於疎流體之漲溢剩餘陳滯汚  
瀦文利凝體之牽張壅鬱弛緩窒塞、以啓病毒泄  
出之路也、緩下藥也、而微用之、則強壯諸腸、以  
反止諸液之漏泄、又能入于血中而驅其苛液矣、  
湧吐劑也、而善用之、則以變一身之機運、又能刺  
衝胃腸神經、而應外表之諸患矣、是等妙用非略  
說之所得盡也、刺絡法、亦應與此並列、以其屬  
外治、不設目、詳見于下編、

### 發汗劑第一

達腓飲

方 自製

|                   |         |                                 |         |                                             |                   |                                  |                |          |                                  |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| 接骨木花 苦薏 茅根 精大麥 甘草 | 右五味、水煎、 | 第二達腩飲 <small>原蘭方<br/>斯篤</small> | 接骨木花 甘草 | 右二味、水煎、傷冷毒、痛風等、加薩撒弗刺斯 <small>サツサフラス</small> | 杜松木白檀槐心黒木類及粟穀舍利別、 | 第三達腩飲 <small>原長沙<br/>葛根湯</small> | 桂皮 羌活 紫蘇 葛根 甘草 | 右五味生姜水煎、 | 壯肌達腩飲 <small>速家方<br/>浮萍湯</small> |
|-------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|----------|----------------------------------|

浮萍 荊芥 吳茱萸

右三味、生姜水煎、

壯脬達腠飲

原千金小  
續命湯

桂皮 麻黃 芎藭 防風 防己 烏頭

右六味、生姜水煎、烏頭量多則加甘草、

利胸達腠飲

原長沙小  
青龍湯

桂皮 麻黃 細辛 半夏 紫蘇 杏仁 甘草

右七味、生姜水煎、

鮮泐達腠飲

原局方  
敗毒散

芎藭 羌活 柴胡 防風 薄荷

|           |      |     |     |      |                                         |     |     |     |     |
|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 右五味、生姜水煎、 | 丸散製劑 | 黃石丸 | 二氣丸 | 達腴白散 | 達腴散<br>即陀歇爾私發汗散<br><small>トルヘルス</small> | 黃石散 | 二黃散 | 碧金散 | 黃龍散 |
|-----------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|

|     |       |       |       |            |           |            |           |           |  |
|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|
| 龍腦醋 | 乙方龍腦醋 | 右見于中編 | 應通用諸方 | 麝香丸<br>壯腦部 | 龍腦散<br>全上 | 底野迦<br>息神部 | 息神液<br>全上 | 息神糕<br>全上 |  |
|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--|

湧吐劑第二

第一湧劑

原蘭方  
泊謨

苦薏

三錢

右一味、水煎頓服、

鮮瘡湧劑

即外臺  
常山湯

常山

二錢

右一味、水煎、一夜放冷頓服、

塩湯吐法

即千金  
塩湯方

食塩

右一味、白湯和、多飲之、

|               |            |
|---------------|------------|
| 健胃湧劑          | 原和方<br>三味湯 |
| 藿香 木香 益智      |            |
| 右三味、水煎、或沸湯浸用、 |            |
| 丸散諸製劑         |            |
| 瓜蒂散           |            |
| 湧痰丸           | 即定喘丸       |
| 右見于丸散方府       |            |
| 第二湧劑          |            |
| 第三湧劑          |            |
| 第四湧劑          |            |

|      |      |      |    |       |       |                    |  |               |                     |
|------|------|------|----|-------|-------|--------------------|--|---------------|---------------------|
| 第五湧劑 | 常用湧劑 | 爽涼湧劑 | 吐酒 | 右見于中編 | 煙草舍利別 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘 |  | 瀉下劑第三<br>追蟲劑附 | 融泄劑<br>即長沙調<br>胃承氣湯 |
|------|------|------|----|-------|-------|--------------------|--|---------------|---------------------|

|                 |                            |                   |                                    |              |               |                                   |              |                  |                                  |
|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| <p>大黃 芒硝 甘草</p> | <p>右三味、生姜下二味水煎湯成入芒硝又芒硝</p> | <p>一味、湯溶和用取可、</p> | <p>緩下劑 <small>即長沙大黃甘草湯</small></p> | <p>大黃 甘草</p> | <p>右二味、水煎</p> | <p>通矢劑 <small>原長沙小承氣湯</small></p> | <p>大黃 枳實</p> | <p>右二味、生姜水煎、</p> | <p>健胃盪劑 <small>原蘭方失勃</small></p> |
|-----------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|

於單方健化飲方中加大黃

和腸湯劑

自製方

當歸

芍藥

茯苓

𤣎<sup>ア</sup>刺<sup>ラ</sup>比<sup>ビ</sup>𤣎<sup>ア</sup>趨<sup>ゴ</sup>謨<sup>ム</sup>

膠<sup>無、則代椿</sup>或桃膠用

大黃

右五味、水煎、

驅壞湯劑

原局方  
涼膈散

薄荷

黃芩

梔子

橙皮

大黃

芒硝

右六味、生姜<sup>上</sup>五味水煎、湯、成入芒硝

正膽湯劑

即長沙  
瀉心湯

黃芩

黃連

大黃

右三味、水煎、

|                                  |                                                                                                     |                                                                                 |             |                          |                                          |                |                                  |                                           |                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <p>清涼盪劑</p> <p>原 蘭 方<br/>重 局</p> | <p>荅<sup>タ</sup>麻<sup>マ</sup>林<sup>リン</sup>度<sup>ド</sup></p> <p>硝石</p> <p>石蜜</p> <p>原 用<br/>蜂 蜜</p> | <p>右三味、水煎、無荅<sup>タ</sup>麻<sup>マ</sup>林<sup>リン</sup>度<sup>ド</sup>、則以梅肉舍利別代之、</p> | <p>去石蜜、</p> | <p>第二清涼盪劑</p> <p>自製方</p> | <p>乾葡萄</p> <p>硝石</p> <p>大黃</p> <p>大麥</p> | <p>右四味、水煎、</p> | <p>救敗盪劑</p> <p>原 蘭 方<br/>我 爾</p> | <p>玫瑰花</p> <p>乾葡萄</p> <p>硝石</p> <p>大黃</p> | <p>右四味、水煎、</p> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|

|                        |                             |                  |                        |                                          |                |              |                                          |              |           |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------|
| <p>鮮泐盪劑</p> <p>自製方</p> | <p>芎藭 連翹 荊芥 薄荷 梔子 石膏 大黃</p> | <p>右七味、生姜水煎、</p> | <p>排毒盪劑</p> <p>自製方</p> | <p>茅根 粘魚鬚<small>無則代菝葜</small> 龍芽草 大黃</p> | <p>右四味、水煎、</p> | <p>丸散諸製劑</p> | <p>峻下劑</p> <p>即巴豆 蘆薈 雌黃 諸劑、見于下及殺蟲劑中、</p> | <p>三物備急丸</p> | <p>紫圓</p> |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------|--------------|-----------|

|             |             |         |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 快<br>丸<br>子 | 石<br>鹼<br>丸 | 右見于丸散方府 | 芎<br>黃<br>散 | 無<br>價<br>散 | 驅<br>壞<br>丸 | 淨<br>府<br>丸 | 繭<br>絲<br>丸 | 控<br>涎<br>丹 | 蘆<br>薈<br>丸 |
|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|      |      |      |      |     |       |       |                     |     |       |
|------|------|------|------|-----|-------|-------|---------------------|-----|-------|
| 常用盪丸 | 驅風下丸 | 融釋下散 | 潤滑盪鍊 | 碧雪鍊 | 右見于中編 | 將軍舍利別 | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 外施方 | 疎滌注腸劑 |
|------|------|------|------|-----|-------|-------|---------------------|-----|-------|

|         |       |       |     |       |       |           |            |             |              |
|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 第二疎滌注腸劑 | 滑利注腸劑 | 導尿注腸劑 | 導尿挺 | 右見于下編 | 應通用諸方 | 涼蜜<br>清涼部 | 換胎丸<br>蠲微部 | 克酸瀉散<br>克酸部 | 乙方克酸瀉散<br>全上 |
|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------|------------|-------------|--------------|

|                      |                         |                      |  |              |                                 |                                 |                  |               |                          |
|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| <p>碧雪散</p> <p>全上</p> | <p>強壯通利酒</p> <p>利尿部</p> | <p>茉莉酎</p> <p>全上</p> |  | <p>附追蟲諸劑</p> | <p>追蟲湯劑</p> <p>原東洋<br/>鷓鴣菜湯</p> | <p>鷓鴣菜</p> <p>苦楝皮</p> <p>大黃</p> | <p>右三味、生姜水煎、</p> | <p>健胃追蟲湯劑</p> | <p>於芽六健化飲方中去纈草加鷓鴣菜大黃</p> |
|----------------------|-------------------------|----------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|

|    |     |     |       |         |       |       |       |     |       |
|----|-----|-----|-------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 丸劑 | 芟凶丸 | 蘆薈丸 | 四味肥兒丸 | 右見于丸散方府 | 第二芟凶丸 | 第三芟凶丸 | 第四芟凶丸 | 化蟲丸 | 右見于中編 |
|----|-----|-----|-------|---------|-------|-------|-------|-----|-------|

|     |     |      |       |       |            |      |       |             |
|-----|-----|------|-------|-------|------------|------|-------|-------------|
| 外施方 | 殺蟻挺 | 蟲痔薰劑 | 右見于下編 | 應通用諸方 | 阿魏酹<br>息神部 | 健胃諸劑 | 利尿劑第四 | 通利平劑<br>自製方 |
|-----|-----|------|-------|-------|------------|------|-------|-------------|

|                     |                |                                       |                       |              |                |                              |                                                                            |                               |            |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| <p>茅根 杜松子 硝石 甘草</p> | <p>右四味、水煎、</p> | <p>通用通劑 <small>原方<br/>六物湯</small></p> | <p>赤小豆 澤漆 牽牛子 生商陸</p> | <p>澤瀉 木茱</p> | <p>右六味、水煎、</p> | <p>通利羹 <small>傳方</small></p> | <p>生商陸 <small>二錢</small> 接骨木葉 <small>一錢</small> 茅根 <small>一錢五分</small></p> | <p>右三味、水五合煮、取汁、入赤小豆一合、煮熟、</p> | <p>一日盡</p> |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|

|                               |                            |                |                                |                            |                  |                                   |                    |                        |             |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| <p>強壯通劑</p> <p>原蘭方<br/>我爾</p> | <p>水楊梅 纈草 桂皮 杜松子 蒼朮 紫蘇</p> | <p>右六味、水煎、</p> | <p>壯脬通劑</p> <p>原家方<br/>無憂湯</p> | <p>枳榔 木茱 吳茱萸 麻黃 蒼朮 接骨木</p> | <p>右六味、生姜水煎、</p> | <p>第二壯脬通劑</p> <p>原長沙木<br/>防已湯</p> | <p>防已 桂皮 人參 石膏</p> | <p>右四味、生姜水煎或加鐵屑耐用、</p> | <p>鮮泐通劑</p> |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|

於第三鮮泐飲方中加生商陸

瀉利通劑

原蘭方  
我爾

白芷 水楊梅 桂皮 白朮花 雷遺塩

右五味、水煎、朮花、或代當実

和齏通劑

原得效  
四苓散

茯苓 蒼朮 猪苓 澤瀉

右四味、水煎、

制齏通劑

原千金  
越婢湯

麻黄 蒼朮 茯苓 石膏 大棗

右五味、水煎、

|                                            |                                                                      |                |                                               |                                |                |              |              |              |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>開發飲</p> <p><small>蘭方<br/>斯篤</small></p> | <p>茅根</p> <p>粘魚鬚<small>魚則代<br/>菝藟</small></p> <p>小茴香根</p> <p>雷遺塩</p> | <p>右四味、水煎、</p> | <p>第二開發飲</p> <p><small>原蘭方<br/>羅仙</small></p> | <p>茜根</p> <p>橙皮</p> <p>小茴香</p> | <p>右三味、水煎、</p> | <p>丸劑諸製劑</p> | <p>定痛排毒丸</p> | <p>強壯通利酒</p> | <p>右見于中編</p> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|        |      |     |                           |                           |                     |                           |            |     |      |
|--------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----|------|
| 杜松子露及油 | 甘硝石精 | 茉莉酹 | 亭長酹<br><small>為猛劑</small> | 海葱酹<br><small>為峻劑</small> | 右主能服法見于中編、製法見于製藥帳秘、 | 篤耨油<br><small>為峻劑</small> | 右主能服法見于中編、 | 外施方 | 通利擦劑 |
|--------|------|-----|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----|------|

|     |       |       |            |             |            |           |            |            |                   |
|-----|-------|-------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|
| 測胞子 | 右見于下編 | 應通用諸方 | 琥珀油<br>壯腦部 | 小茴香露<br>驅風部 | 硃砂糕<br>解凝部 | 雷遺塩<br>全上 | 碧龍散<br>蠲微部 | 碧雪散<br>克酸部 | 究理堂備用方府上編卷之三<br>畢 |
|-----|-------|-------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|

究理堂備用方府上編附錄

鮮毒方

凡十六種

信石毒

與新鮮膽八油、吐之、以甘乳酪、射注肛中、煮

麻油一碗灌之立可起死神驗

經良

罌粟子石蜜硝石等、作湏劑飲之、李子

枯礬三錢、調水飲之、秋燈

按濟生方治諸蠱毒簡便方鮮諸中毒並用芽茶等分可併考

削墨兒方、見于斑猫毒下、

猛汞猛水毒

與信石毒同

李子

水銀毒

吐涎不止、發諸惡症、及血液烱崩、神經衰損、精力  
虛憊者、先與輕下劑、滌除其毒、用<sup>アラヒヤゴ</sup>砒刺比<sup>ム</sup>砒膠漿

中編

及乳汁、和其毒、與龍腦散、

中編

分利之

遠名

發惡性潰瘍、肢節檀掉、搐掣、劇痛等者、  
土木香、一味為煎劑、或為熬膏、入土茯苓煎中服、

又焰堊散

中編

服之、並良、

依百  
茯苓

按時珍亦云土  
鮮汞粉銀朱毒

長服後、水銀留滯體中為害者、硝石精、猛水、  
海塩精、硫黃、醎醋、草木酸汁、服之、能溶化之、  
遠名

|                                                      |            |                                               |                                                   |                               |                                                         |                                                             |                                                         |                                                  |                                                           |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>宜半脚湯、<br/><small>遠名 按血液焔崩<br/>衰弱者不冝施之</small></p> | <p>阿片毒</p> | <p>用醎醋温熱入砂糖灌下一二椀探吐之<br/><small>保鮮</small></p> | <p>先施刺絡、與吐酒石<br/><small>厘八</small> 及吐根、吐之、猶不覺</p> | <p>者、醎醋撒面上、及嚙之、又鼻硃砂精氣、及吹鼻</p> | <p>中、又施注腸劑、<br/><small>依百遠名 按注<br/>腸劑 冝焔 醎醋</small></p> | <p>龍腦散、<br/><small>編中</small> 服之、<br/><small>遠名</small></p> | <p>班猫毒<br/><small>芫青、葛上亭長硃、用<br/>之利尿劑者、見于下、</small></p> | <p>用生鷄卵開孔灌入口中連灌五六枚得吐即活<br/><small>洗冤</small></p> | <p>先施刺絡、與罌粟子、<br/><small>アラヒヤゴム</small> 亞刺比亞膠、硝石、石蜜等、</p> |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                       |           |                                                              |                                |                                            |                                              |                |                                |                                                      |                                          |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>渾劑、後、渾劑中加複方栗殼舍利別、<br/> <small>製藥帳秘</small> 與之、</p> | <p>李子</p> | <p>龍腦散<br/> <small>中編</small> 服之、<br/> <small>遠名</small></p> | <p>甘巴且杏油、乳酪等分調、每服一匕、無、即膽八油</p> | <p>人乳亦可、就睡者為知、次與緩<small>緩</small>和通利藥、</p> | <p>錦葵大麥麻仁三味、為注腸劑、<br/> <small>削墨</small></p> | <p>附子烏頭鈎吻毒</p> | <p>陰陽湯、和酢多飲之、以取吐、乳酪清、調硝石、為</p> | <p>注腸劑、栗子硝石、及複方栗殼舍利別<br/> <small>製藥帳秘</small> 等、</p> | <p>水煎、作渾劑、服之、<br/> <small>李子</small></p> |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                         |              |                                                                       |                                                  |            |                             |                                                                    |                                  |               |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| <p>黑豆甘草二味、煎服</p> <p><small>原肘後鮮巴豆毒方、依徐之才說用之</small></p> | <p>峻猛下藥毒</p> | <p>先令患者安靜、飲甘乳酪、服阿片發汗安質謨</p> <p><small>ア<br/>ン<br/>チ<br/>モ</small></p> | <p><small>製藥帳秘</small> 調和者、<small>李子</small></p> | <p>吐藥毒</p> | <p>瓜蒂毒、多飲溫湯、不止者、與冷水及冷粥、</p> | <p>豆豉煮汁、冷服之</p> <p><small>驗方</small>煎麝香湯下咽立止、<small>儒門</small></p> | <p>按下藥毒、療之、<small>私考</small></p> | <p>峻猛利尿藥毒</p> | <p>多服緩和藥、<small>我爾</small></p> |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|

馬錢毒

飲冷水、  
又服甘草煮汁、  
驗方

番茄毒

上好末茶、以塩湯點之、頻々與之、  
又用三黃湯、

即正膽  
盪劑  
下之、  
驗方

河豚毒

蘆根煮汁、飲之、  
長沙

枯礬服之、  
詳于信石  
毒條下  
乾柔魚煮汁、多飲之、

藍葉煮汁、及金汁、飲之、  
並俗間方

施塩湯吐法、  
橙汁、及酸味下藥、服之、  
行注腸

|                                           |           |                                    |                          |              |                                    |                                |                                  |                                         |             |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <p>法、<br/>服龍腦散、<br/><small>私考</small></p> | <p>菌毒</p> | <p>人糞汁、土漿、大豆濃煮汁、飲之、<br/>服諸吐利藥、</p> | <p><small>長沙</small></p> | <p>諸鮮毒大意</p> | <p>煮甘草薺芎汁、飲之、<br/>又云、凡煮藥飲汁、以鮮毒</p> | <p>者、雖云救急、不可熱飲、諸毒病、得熱更甚、宜冷</p> | <p>飲之、<br/><small>長沙</small></p> | <p>究理堂備用方府上編附錄<br/><small>畢</small></p> | <p>引用書名</p> |
|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |               |       |             |
|------|---------------|-------|-------------|
| 引用書名 |               | 漢方醫籍部 |             |
| 長沙   | 張仲景、傷寒論、金匱要略、 | 肘後    | 葛洪、肘後方、     |
| 錄驗   | 甄立言、古今錄驗、     | 千金    | 孫思邈、千金方     |
| 外臺   | 王燾、害墓秘要、      | 聖惠    | 宋太宗勅撰聖惠方    |
| 聖濟   | 徽宗刺勅著、聖濟總錄、   | 局方    | 徽宗刺勅著、和劑局方、 |
| 三因   | 陳無擇、三因方、      | 濟生    | 嚴用和、濟生方、    |
| 直訣   | 錢仲陽、小兒直訣、     | 得効    | 危亦林、得効方、    |
| 辨惑   | 李東垣、辨惑論、      | 實鑑    | 羅天益、衛生實鑑、   |
| 薛氏   | 薛己、十六種、       | 回春    | 龔廷賢、萬病回春、   |

|                                                                |                                                             |                                                                |                                                              |                                                             |                                                            |              |                                                                                      |                                                                                        |                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>壽世</p> <p>龔廷賢、<br/>壽世保元</p> <p>準繩</p> <p>王宇泰、證<br/>治準繩、</p> | <p>儒門</p> <p>張子和儒<br/>門事親</p> <p>食鑑</p> <p>寧源食鑑<br/>本草、</p> | <p>時珍</p> <p>李時珍本<br/>草綱目、</p> <p>正宗</p> <p>陳實功、外<br/>科正宗、</p> | <p>入門</p> <p>李挺醫學<br/>入門、</p> <p>指掌</p> <p>皇甫中、<br/>明醫指掌</p> | <p>東洋</p> <p>東洋山脇<br/>先生方、</p> <p>經良</p> <p>鄒福經<br/>驗良方</p> | <p>漫遊</p> <p>獨嘯菴先生<br/>漫遊雜記</p> <p>保鮮</p> <p>保元<br/>鮮唾</p> | <p>蘭方醫書部</p> | <p>回斯</p> <p>ヘーステル<br/>回斯篤児、<br/>内外科書</p> <p>李子</p> <p>リス<br/>李子、内科書、<br/>及三法方典、</p> | <p>武郎</p> <p>フランカールツ<br/>武郎加児都、<br/>内外科書</p> <p>我爾</p> <p>ゴルトル<br/>我爾德児、<br/>内外科書、</p> | <p>蘭局</p> <p>和蘭局方</p> <p>削墨</p> <p>シヨメール<br/>削墨児、雜書、</p> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|    |                         |    |                       |
|----|-------------------------|----|-----------------------|
| 私微 | スウイテン<br>私微天、内科書        | 花魯 | ハアル<br>花魯、私微天注、       |
| 低電 | デーテン<br>低電、内外科書         | 撒謨 | ヒユクサム<br>夫古撒謨、熱論、     |
| 布斂 | ヤーコツブレンキ<br>牙谷勃布斂己、内外科書 | 鐵訣 | テツケルス<br>鐵訣児私、内科書     |
| 些児 | セールニユス<br>些児拙思、外科書      | 蘊私 | ユンスル<br>蘊私児、外科書、      |
| 多歇 | トーヘルス<br>多歇児私、外科書       | 依百 | エペイ<br>依百乙、藥性辨、       |
| 蒲宇 | ホウト<br>蒲宇土、藥局、          | 斯篤 | ストロク<br>斯篤碌古、内科書      |
| 羅仙 | ローセンステイン<br>羅仙斯的印、内外科書、 | 室速 | チツソツト<br>室速杜、内科書      |
| 桂令 | クワリン<br>桂令、             | 禮嵩 | レーソニス<br>禮嵩思、加羅蔑児、驗方、 |
| 月斯 | ゲツスル<br>月斯児、外科書、        | 昆私 | コンスピュルグ<br>昆私廳児偃、内科書  |
| 扶歇 | ヒュヘランド<br>扶歇蘭度、經驗説、     | 利加 | リカルド<br>利加児度、内科治療書、   |

|                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                     |                                            |              |                                                                                                    |                                                                                         |                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| <p>遏爾 <small>アル子マン</small><br/>遏爾涅槃、藥性主治書</p> <p>日多 <small>ユトーアルドイール</small><br/>日多亞爾鐸以涅兒、經驗方</p> | <p>失勃 <small>シーボルト</small><br/>失勃兒杜、驗方錄</p> <p>亞局 <small>アムステルダム</small><br/>亞謨斯的兒達謨、局方、</p> | <p>拔局 <small>バターヒア</small><br/>拔太盼亜、局方、</p> <p>戾局 <small>レイテン</small><br/>戾鄧、局方</p> | <p>華拳 <small>ハーゲン</small><br/>耒舶醫、華拳方、</p> | <p>以下印行書</p> | <p>六物 <small>六物新志、<br/>磐水先生譯著</small></p> <p>熱病 <small>ヒユクサム<br/>夫古撒謨、熱病論、吉田<br/>長叔譯著、</small></p> | <p>纂要 <small>醫方纂要、江<br/>馬元弘輯譯、</small></p> <p>遠名 <small>遠西名物考、<br/>宇田川榛齋輯譯、</small></p> | <p>藥鏡 <small>和蘭藥鏡、<br/>宇田川榛齋輯譯、</small></p> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|

雜書

秋燈

秋燈業活

洗冤

洗冤錄

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|