

究理堂備用方府中編目次

卷之一

丸部

壯脬丸

新考黑鋼丸

幾那丸

鋼華丸

麝香丸

壯肺興復丸

乳沒丸

壯肺利胸丸

健化丸

第二健化丸

熊膽丸

新考千金丸

津比丸

壯宮丸

	通經丸	芙蓉丸
第二芙蓉丸	鎮瘧丸	
鎮瘧阿魏丸	鎮神丸	
了々丸	阿魏丸	
乙方阿魏丸	玉蟾丸	
安石丸	雪蚕蛻	
蠲蠲丸	新考換胎丸	
一氣丸	活骨丸	
興復熊膽丸	黃石丸	
二氣丸	石鹼丸	

石龍散	機那散	散部	乙方亭長解毒丸	定痛排毒丸	化蟲丸	第四芟凶丸	第二芟凶丸	常用盪丸	鮮凝魏胆丸
碧實散	龍腦散			亭長解毒丸	海金丸	第五芟凶丸	第三芟凶丸	驅風下丸	快丸子

菖蒲散	第二健胃散
黃龍散	鉛糖散
壯宮散	亜鉛花散
碧龍散	克酸瀉散
乙方克酸瀉散	碧雪散
鉛華散	碧雪下散
救急子	硫礬散
達腓白散	達腓散
黃石散	二黃散
碧金散	雙鷺散

第二湧劑	第三湧劑
第四湧劑	第五湧劑
常用湧劑	綿馬散
解泐下散	肝硫散
清涼通利散	
卷之二	鍊部
壯脰鍊	安息香鍊
底野迦	單味底野迦

潤腸鍊 碧雪鍊	糕部	硫華糕 祛痰健化糕	硃砂糕 水玉糕	液部	刺衝液 第二刺衝液	鎮瘧液 第二鎮瘧液	健胃液 鎮嘔液	第二鎮嘔液 消風液	息神液 第二息神液
------------	----	--------------	------------	----	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

爽涼湧劑	
浸部	
玫瑰浸	機那浸
蛎灰浸	実芰浸
漿部	
清涼醒神液	鉛糖漿
滋肺漿	御米湏
清潤漿	潤燥漿
第二潤燥漿	ア ラ ビ ア ゴ ム 亜刺比亜趨謨漿
蜜部	

海葱蜜 凉蜜	玫瑰蜜	酒部	壮脬酎 洎夫藍酒	健胃酒 回春酒	健胃酎 攀桂酎	麻沸酒 葍菜酒	蠲齏酎 吐酒	強壯通利酒	醋部
----------------------	------------	-----------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------	-----------

鎮瘧醋	龍腦醋	民埕列里精	薔薇醋	餌部	滋養濟	鹿角膠	卷之三	單用製菜品主能服恣	糖製部
海葱醋	乙方龍腦醋	接骨木醋			滋養糕				即舍利別

玫瑰花舍利別 蜀葵舍利別	石長生舍利別 栗殼舍利別	複方栗殼舍利別 回青橙汁舍利別	佛手柑瓢舍利別 覆盆子舍利別	桑椹舍利別 烟草舍利別	大黃舍利別 杜松子傑列乙	酹製部	桂皮酹 阿魏酹	茉莉酹 海葱酹	鐵屑酹 亭長酹
----------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------	----------------------------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

熬膏部		健質亜那熬膏		甘草熬膏		烏頭熬膏		蒲公英熬膏		昇露部		桂皮露		茴香露		杜松子露		昇精部		驅風精 即消疔露		忽布蒲鎮痛液 ホフマン アーテル		甘硝石精		亜的兒		硃砂精		鹿角精	
-----	--	--------	--	------	--	------	--	-------	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	-----	--	----------------------------	--	--	--	------	--	-----	--	-----	--	-----	--

杜松子精	昇油部	小茴香油 杜松子油	篤耨油 琥珀油	製塩部	琥珀塩 撒兒剝禮傑列私篤 即雷遺塩	鹿角塩	造釀部	葡萄酒	究理堂備用方府中編目次 畢
------	-----	--------------	------------	-----	-------------------------	-----	-----	-----	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

究理堂備用方府中編卷之一

平安小石龍元 瑞父 輯

丹後福田一 以貫 參訂

尾張奥村閑 士誠 參訂

丹後萩野謙 受益 編次

平安吉雄則 乾德 校

丸部 方四十七首

壯脬丸 自製 主治、纖維衰弱諸症、癱瘓痿躄等、

黒鋼

製法、見于
製藥帳秘、

健質亜那

各一
錢

肉豆蔻

五分

桂枝 五錢 丁香 乾姜 各三分	右六味、細末、糊丸、五日服盡、	飲劑送下	新考黑鋼丸 原失勃 主治、纖維弛緩、生惡液、一身萎黃懈怠	者、	黑鋼 蕎麥粉 各四十 真沒藥 三錢、藥舖、稱煉沒藥者、是也、	肉桂末 二十	右四味、研合、水調為丸、每用半匕、至二匕、飲劑	送下、	幾那丸 自製 主治、纖維弛緩諸病、
--	------------------------	-------------	---	-----------	---	------------------------------	--------------------------------	------------	--

幾那六棗

黑鋼二棗

右二味、研和為丸、日用一匕、至三七、

鋼華丸

利加

主治、諸失血、下利、滑精、遺精、

脾肝腸間膜閉塞、經閉等、又下絡蟲、

鉄銹

製法見于
製藥帳秘

右一味、為丸、桂皮露水送下、一日一分五厘、至一棗、
用之絡蟲、小兒一歲、至十歲、一日八厘、至三分三厘、
大人二棗至四棗、以輕下藥送下、

麝香丸

遠名

主治、強壯頭腦神經及心臟、鎮痙攣、

解稠血、發汗、驅風、又主神經疫及諸熱病虛衰遷延

諸症、	麝香 五厘	右一味、加麪粉少許、水調為丸、或加砂糖、或加龍腦、	或加硝石、飲劑送下、	壯肺興復丸 我尔 主治、肺癰膿化、無炊衝候者、	拔爾撒謨孛露 バルサムペーリウ 拔爾撒謨格泮藿 バルサムゴツハイ 各二錢	雞子白 四錢 甘草末 適宜	右四味、研和、為丸、初用五六丸漸加、飲劑送下、	乳没丸 我尔 主治、同前丸、	真没藥 二錢 雞子黃 一撮
-----	----------------------	---------------------------	------------	--	---	---	-------------------------	-------------------------------	---

二味、梔和、入下項、	上好乳香 二撮	右調勻、為丸、初服五六丸、漸加、飲劑送下、	壯肺利胸丸 我尔 主治、肺氣衰弱、粘液室塞者、	躡謨安謨尼亞吉 ゴムアンモニアキ 二錢 拔爾撒謨亭露 バルサムペーリウ	蘇合香 各五分、代用蘇合油、 回青橙皮末 適宜	右四味、調勻、每一錢、為十五丸、每半時服一丸、	葡萄酒送下、如無葡萄酒、則姜湯亦可、	健化丸 原我尔 主治、胃氣虛弱、粘液污滯、飲食腐壞、	失消化之機者、
-------------------	-------------------------------	------------------------------	--	--	--	--------------------------------	---------------------------	--	----------------

乳香 七分 沒藥 雷遺塩 各二錢、製法、見于製藥帳秘、	良姜 三錢 薄荷油 一分、製法、見于製藥帳秘、	上好石鹼 四錢、製法、見于製藥帳秘、	右六味、研末、合和糊丸、每用半匕、日二、或三、	單湯送下、	第二健化丸 原纂要 主治、胃氣衰弱、腸間腐壞、及生蟲者、	黑銅 五錢 白桂 十錢 回春橙皮 五錢 健質亞那 五錢	右四味、細末、合和糊丸、每用十五丸、至百粒、單湯	送下、	新考千金丸 自製方 主治、与丸散方府所載同、
--	---	--	--------------------------------	--------------	---	---	---------------------------------	------------	---

健質臣那 回春橙皮 各八	纈草官園 姜黃 各十	右四味、為丸每日用一匕、至二三匕、小兒為小粒酌量用	熊膽丸 自製 主治、胃氣虛弱、一身衰廢、及膽液失性、	飲食酸敗、不能成良液者、	熊膽 一錢 甘草末 五分	右二味、研合糊丸、忝米大、每用十粒、至二十粒、單	湯送下、	牛胆丸 原蘭方 主治、同上、	牛胆熬膏 五厘、至三分、蘭來者、丸可和產者、加用、 甘草熬膏 二厘、至一分、
---	---	----------------------------------	---	---------------------	--	---------------------------------	-------------	---	--

右二味、研合為丸、一日服尽、勞瘵者、或加烏頭、下痢者、加格綸僕、

律比丸

遠名

主治、胃腸衰弱、大便不利、內臟壅滯、

萎黃病、經閉等、

蘆薈

十六錢

真沒藥

四錢

洎夫藍

二錢

右三味、細末、加燒酒少許、或常用舍利別、為丸、服量半錢、至一錢、欲取微利者、十八里、至一分、

壯宮丸

桂令

主治、白帶下、

玫瑰花末

八錢

砂糖

四錢

綠礬油

十四滴、製法、見于製藥帳秘、

拔爾撒謨格泮藿

四錢

右四味、研末、為丸、一日三分、至七分、單湯、或飲劑送下、

通經丸

依百

主治、經閉、因纖維諸管怠慢、

而不痙攣、及多血者、

趨謨安沒尼亜幾

沒藥

各二錢

蘆薈

三分三厘

良姜

一錢、原用薩毘那油、今代之、

右四味、為丸、一丸重五厘、一日用二十丸、單湯或飲劑送下、

芙蓉丸

自製

主治、催睡、和痛、鎮痙

阿芙蓉

龍腦

茯苓末

各等分

右三味、研合、每五錢、加水、分為六十丸、每用一丸、或二丸單湯送下、

第二芙蓉丸

自製

主治、與前丸同、

阿芙蓉

八分

麝香

五厘

龍腦

三分

茯苓末

一錢五分

右四味、研合、加水、分為二十丸、金箔為衣、每用一丸、單湯送下、

鎮瘧丸

自製

主治、腹中不眨拘急、及瘧瘵輕症、

底利荅幾私熬膏

一錢

纈草

三十錢

右二味、為丸、每用十粒、或二十粒、不知漸加、

鎮瘧阿魏丸

原布
斂

主治、子宮衝逆諸患、

阿魏 一錢 阿片 一分	右二味、研合、為丸、三五日服、單湯、或飲劑送下、	鎮神丸 自製 主治、精神錯乱、不寐躁擾者、	辰砂 八錢 阿片 二分 龍腦 四分	右三味、研合、糊丸、七日服盡、飲劑送下、	了々丸 家方 主治、癩癰、及諸驚搐、因酸液、蛔蟲、	諸瘡內伏者、	鉛 十五錢 水銀 二十錢 硃砂 乳香 各十錢	牛黃 七錢	右五味、先以鉛、內熱銕內、鎔化、下水銀、候和、取
---	---------------------------------	--	---	-----------------------------	--	---------------	---	-----------------------------	---------------------------------

硫黃末、鉄匙抄糝之、焰發、則急以鉄筋攪之、漸加
硫黃末、不見銀色為度、猶安火上、鉄筋攪不住手、候
不烟見、下火、研末、加下三味、糊丸、芡實大、一日服
二丸、臨服槌碎、新汲水送下、稍加至三五丸、小兒
酌量、

阿魏丸

自製

主治、粘稠諸症、子宮衝逆、經水不利、諸藏

閉塞、胃中粘液、經久痰咳、瘡後水腫等、

阿魏 二錢

精製硝石

五錢、製法、見
于製藥帳秘、

右二味、研合、糊丸、每用半匕、或一二匕、飲劑送下、

乙方阿魏丸 自製

主治、同前、

阿魏二錢 大黃末 上好石鹼各一錢五分	右三味、研合、糊丸、每用一匕、至二匕、飲劑送下、或去	石鹼、加甘草、三味等分為丸用、失勃	玉蟾丸羅仙 主治、龜胸、龜背、及肺氣不利、粘液瘀滯	為喘者、	上好石鹼一分六厘 牛膽一厘六毛 半夏末四厘八毛	右三味、研合、分為十四丸、銀箔為衣、一日八丸、飲	劑第二開 送下、 發飲	安石丸依百 主治、纖維弛弱、血中多粘液、腹部諸藏	壅塞、或為衝逆痙攣、因為經水不利者、
---	-----------------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------------	--	--	---------------------------

龍膽熬膏 製法、見于 製藥帳秘、 趙謨安沒尼亞幾 ゴムアンモニアキ	上好石鹼 各十 六錢	右三味、研合、為丸、一丸重四厘六毛、每用五丸、日	四次、飲劑、或單湯送下、兼白帶下者、加鐵劑香竈	藥品、	雪蠶蛻 和方、 蛻音兌 主治、肺病勞瘵、咳甚者、	蟲白蠟	右一味、研碎、加糊為丸、每用一匕、日二三次、飲劑	送下、	蠲蠲丸 扶歇 主治、蠲毒諸症、
---	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	------------	---	------------	---------------------------------	------------	--

猛汞 一分二毛 蒸餾水浴和 蒸餅 砂糖 各適宜	右三味、研和、為百八十丸、每三十丸、右猛汞一厘七	毛、服法、今或用獨鬆跋說、一方、加阿片、与猛汞同量、	新考換胎丸 自製 主治、黴毒、及粘稠諸病、又下蟲、及	惡膽液、腸間腐壞、小兒胎毒、	大黃 二十錢 甘汞 四錢、製法、見于製藥帳秘、	右二味、細末、糊丸、一日一匕、至二匕、單湯、或飲劑	送下、小兒細丸、每用三粒、至十五粒、	一氣丸 布斂 主治、梅毒諸症、	水銀 清淨者、一錢、製法、見于製藥帳秘、 亞刺比亞膠末 四錢
--	---------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------	--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---

大黃舍利別 適宜、製法、見于製藥帳秘 白蒸餅 四錢、製法、見于製藥帳秘、	右四味、先以上二味、硝子器極研、至不見星、用顯微鏡照視	下白蒸餅、調勻為丸、一丸重四厘八毛、甘草末	為衣、朝夕服十丸、	活骨丸 傑設兒 主治、龜胸、因酸敗液者、	鐵鏞 八錢 螭蛄石 四錢 銀朱 一錢	右三味、細末、糊丸、二十五日服盡、單湯、或飲劑送	下、散服亦可、或加大黃酒石塩、及麝香、	興復熊膽丸 自製 主治、所謂自敗壞液諸患、	真沒藥 二錢 乳香 一錢 安息香 二錢 熊膽 二分
--	---	------------------------------	------------------	--	--	---------------------------------	----------------------------	---	--

右四味、研末、合勻糊丸、黍米大、初用五七丸、徐々加之、飲劑送下、

黃石丸

遠名

主治、皮表諸瘡、經久不治者、及肺中粘汚、

咳喘不利者、

硫黃鍊花

八錢、製法、見于製藥帳秘、

硝石

二錢

右二味、研合、糊丸、飲劑送下、肺病、加石長生舍利別、

製法、見于製藥帳秘、

二氣丸

原失勃

主治、與二黃散同、

硫黃鍊花

一錢

甘汞

四錢

炭素

適宜以爲色

右三味、研合、糊丸、分十二、飲劑送下、小兒惡散劑

者、宜此方、為細粒用、

石鹼丸

自製

主治、胃腸酸液粘汚、大便秘利、

脾肝腸間膜閉塞硬腫、及老人便秘等、

石鹼

上好者
十錢

大黃末

三十錢

右二味、研合、糊丸、每用一匕、至三七、單湯、或飲劑

送下、

鮮凝魏胆丸

桂令

主治、胃中酸液、胃瘧痞氣、衝逆吞酸、

懊悶惡心、大便●閉者、

牛胆熬膏

阿魏

大黃

各等分

右三味、研和、為丸、每用五分、日一二次、單湯、或飲

劑送下、

快丸子

自製

主治、属血液粘稠諸病、及水腫、宜兼服

此丸、

大黃末

四錢

雷遺塩

三錢

右二味、研合、糊丸、每用二匕、或三匕、飲劑送下、

常用盪丸

自製

主治、大便不通者、

大黃

百錢

枳殼

四十錢

右二味、細末、糊丸、每用一匕、至三七、臨臥空心、白

湯送下、

驅風下丸

自製

主治、腸中腐壞、腹脹者、

石鹼上好者 大黃末 阿魏各二錢	陳皮油十五滴、製法、見于製藥帳秘、 大茴香末五分	右五味、研和、糊丸、每用五分、漸加、飲劑送下、阿魏	或代真沒藥、	第二芟凶丸自製 主治、疎滌胃腸、下諸蟲、為劇劑、	蘆薈三錢 甘汞三分	右二味、研合、加水及麪、為丸、每用二分、單湯、或飲	劑送下、	第三芟凶丸依百 主治、殺諸蟲、為劇劑、	阿魏三錢 藤黃遠名作二匄
--	---	----------------------------------	---------------	--	--	----------------------------------	-------------	---	---

右二味、研合、每一錢、加糊、為二十丸、甘草末為衣、每用三丸、日四次、單湯、或飲劑送下、

第四芟凶丸

原遠名

主治、下虵蟲、為緩劑、

撰綿施那

一錢

大黃

五分

右二味、細末、研合、糊丸、分三、每旦空心、服一分、單送湯下、溫業以下或失刪定甘汞或代鉄礬、能殺組條蟲

衣百

第五芟凶丸

毘私

主治、驅諸蟲、

阿魏

五分

撰綿施那

● 分

健質亞那熬膏

一分 五分

纈草根末

一錢

泥菖根末

適宜

右五味、為丸、每用三分、日二三次、

化蟲丸 和方三因方、有化蟲丸、与此異、 主治、組條蟲、	雷丸 胡粉 苦楝根皮 各一兩 蕪荑仁 五分	史君子 五分 枯礬 一錢五分 枳榔 一兩	右七味、細末、糊丸、黍米大、每用一匕、至三七、單湯	或飲劑送下、按久服者、宜去胡粉、	海金丸 遠名 主治、纖維、及泌尿諸器衰弱、或粘液壅塞、	水腫等、	海葱 三分四厘 蘧謨安沒尼亞幾 沒藥 各二錢	金硫黃 一分七厘	右四味、調和、一丸五厘、每服三丸、日三四次、
---	--	--	----------------------------------	-------------------------	---	-------------	---	--------------------------------	-------------------------------

定痛排毒丸

我尔

主治、痛風、

的列竝底那

上好石鹼

各二錢

乳香末

蘇合油

各六部六厘、
代用蘇合油、

良姜末 一錢

拔爾撒謨孛露

三厘

右六味、先以上二物、上火、候稍稠固、入餘藥調勻、

每一錢、為十五丸、橙皮末為衣、如輒不可丸、則加

煨鹿角末、每用三四丸、飲劑送下、日三次、漸加、

亭長解毒丸

依百

主治、狂犬毒、狂躁、及恐水病、

葛上亭長

一分、原
用芫菁、

桂枝

砂糖

各二分

右三味、細末、加玫瑰花舍利別、

製法、見于
藥帳秘、

為三十

丸、一歲兒、每一時一丸、四歲兒、二丸、七歲以上、四丸、大人六丸、單湯送下、創處、貼發泡膏、方、見于編、冷膿化、	又數溫浴之、	乙方亭長鮮毒丸遠名 主治、與前丸同、此方可久服、	葛上亭長一厘六毛 甘汞三厘 龍腦一分六厘	右三味、研和、加亞刺比亞趨謨漿、方、見于次卷、為丸、每夜	服一劑、石蜜湯送下、創處、貼鮮靱膏、方、見于編、治後	半年、猶服此方為妙、		
---	---------------	--	--	--	---	-------------------	--	--

散部 方二十七首

機那散

方 原 蘭

主治、纖維衰弱諸症、及諸熱病、

大勢已去、見虛者、及勞瘵無大熱者、

機那末 二錢

右一味、分五、一日服、單湯、或砂糖湯送下、胃氣虛

弱者、加燒酒四五滴研勻服、治間歇熱、用八錢、

龍腦散 遠名

主治、諸熱病、神經衰弱、險痘膿漿不熱、

疥癬瘡瘍內陷、傷冷毒、胸脇痛、痛風內藏衰弱、

脾病等、

龍腦 一分

砂糖 一錢

右二味、研合和、分服、白湯送下、六時、或十二時、用盡、或加硝石、

石龍散

原昆私

主治、衝動神經、稀鮮血液、以療諸

頑痺閉塞症、又能發汗鎮痙、

吐酒石

二毛至八毛

龍腦

五分至一分

砂糖

適宜

右三味、研合、一日服、單湯送下、或加阿片、或去龍腦、

加螻蛄石

三分、

碧實散

昆私

主治、脉動大過、焮衝性諸熱、又用之催

進分利諸機、

寔吉打力思

自一厘六毛至七厘

碧雪丹

自一厘五毛至五厘

砂糖 適宜

右三味、研合分、三五服、大麥煎、或飲劑送下、

菖蒲散 叔墨

主治、稽留間歇諸熱、精力虛之者、及

壞血病等、

菖蒲

石菖泥
菖並同

右為細末、每用六七分、一日六次、或八次、加砂糖、

白湯送下、

第二健胃散 自製

主治、胃氣虛弱、酸敗諸症、

官種姜黃 五錢

白堊土 十錢

真沒藥 二錢

良姜 二錢

薄荷油 九滴

右五味、細末、研合、每用三分、空心白湯送下、

黃龍散

遠名

主治、肺病、咳嗽、傷冷毒諸痛、

金硫黃

六厘
四毛

龍腦

三厘
二毛

精製硝石

六分六
厘六毛

右三味、研合、分四、一日服、砂糖湯送下、或本劑中

加砂糖三錢、乾咳甚者、去硝石、加阿芙蓉、亦妙、

鉛糖散

窠篤

主治、肺●痰、因嗽衝熱、僂麻質私熱、

腸胃熱、急發者、其勢猛者、宜此方、

鉛糖

八毛、至五厘、製
法、見于製藥帳秘、

阿片

四毛、至
四厘、

右二味、研勻、加砂糖適宜、分三五用、忌灰塩諸酸、

壯宮散

撰要註

主治、白帶下、

幾那 五分 應的刺皮 代用 白桂 泰皮 各一 錢	硫黃精 五十 滴	右研末、為散、每用三分、冷水送下、一日三四次、	碧龍散 遠名 主治、粘液、水腫、經久眼疾、頑固痛風	等、	碧雪丹 三厘二毛、至四厘八毛、製法、見于製藥帳秘、 龍腦 少許	砂糖 適宜	右三味、研合、一日服盡、單湯、或飲劑送下、	克酸瀉散 原蘭方 主治、胃腸內有酸敗液、為害者、	於菟乳 五分、製、法見于製藥帳秘、 砂糖 二分
--	--------------------------------	--------------------------------	--	-----------	---	-----------------------------	------------------------------	---	---

右二味、研合、臨臥空心頓服、白湯送下、

乙方克酸瀉散

失勃

主治、同上、

於菟乳

大黃末

各一錢

石蜜

五錢、小兒、八錢、

右三味、研合、分服、大人兩日、小兒六日用、白湯送下、

碧雪散

撒謨

主治、腸及胃熱、痘瘡難出、粘液水腫

等、

碧雪丹

三厘

於菟乳

五分

砂糖

二分

右三味、研合、頓服、白湯、或飲劑送下、水腫利甚、加阿片少許、

亞鉛華散

遠名

主治、痙攣搐掣、自神思感動者、小兒

自虬蟲酸液者、其他神經諸病、並効、又通腹部
諸藏壅塞、又用之吐下發汗、

亞鉛鍊華

自三里
至一分

右加砂糖適宜、或配他藥品、分三五服、取吐下發汗之
効、自七里、至二分、

碧雪下散

依百

主治、腸間粘液、惡胆液、汚滯腐壞、尋常

下藥、不得驅出者、及一切焮衝、施刺絡後、餘焰犹盛者、
能變化一身機轉、

碧雪丹

二分

大黃

一合

右二味、研合、加砂糖適宜、分二、先服一分、四分時再服、或為鍊用、見于鍊部、

救急子

失勃

主治、噎食、及脚氣險症、諸瘡內攻、急迫者、

蝻蛄石

一錢

精製硝石

五分

銀朱

三分

右三味、研合、分十二服、噎食、及脚氣急迫、蘿蔔汁下、
蝻蛄石、或代於菟乳、

硫礬散

遠名

主治、一切失血諸症、及水液脫泄、遺精、

白濁、白帶下、小便失禁、並間歇熱、腐敗熱、宜綠礬精者、多用、則作下利、

明礬

自一分五厘至五分、

右一味、和砂糖適宜研勻服、或加阿芙蓉、臣刺比臣膠、作挺、入肛門、治下血不止、	達腓白散 遠名 主治、諸病宜發汗者、	通小便、	發汗安質謨 アンチモ 三厘三毛、至半錢、製法、見于製藥帳秘、	右一味、臨臥、溫湯送下、後飲熱飲、覆臥、	達腓散 遠名 即陀歇尔私 ターヘルス 發汗散 主治、痛風、風毒、諸	骨節痛、又療神經熱、及神經諸病、	吐根末 阿片 各一厘六毛	孕礬酒石 一分四厘、製法、見于製藥帳秘、
--	--	-------------	--	-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------------	--

右三味、研合、臨臥、湯溫頓服、漸加上二味量、至痛和、宜臨用調和、久貯、則無効、如無孕礬酒石、則代用芒硝、儘可、**龍按、此方、輒近不用孕礬酒石、故、久貯無妨、**

黃石散

失勃

主治、疥癬、及皮表諸惡瘡、

硫黃鍊花

二錢

硝石

一錢

砂糖

八錢

右三味、研合、分十二、二日、或三日服、單湯、或飲劑送下、內攻咳嗽者、加甘草末四錢、硝石、足前為四錢、

二黃散

失勃

主治、頭瘡、

硫黃鍊花 二錢 大黃末 二錢 砂糖 四錢	右三味、調和、分十二、二日、或三日服盡、單湯、或飲	劑送下、	碧金散 失勃 主治、諸病毒難分利者、及皮膚諸瘡、	疥癬等、	碧雪丹 二分八厘三毛 金硫黃 一分六厘六毛、製法、見于製藥帳秘、	砂糖 八錢	右三味、研合、分十、日服其三分、單湯、或飲劑送下、	雙鸞散 散見于和蘭輓近書中、又本鋼、引壽域方、 主治、蒸氣閉塞、皮膚病內伏、	宜開達肌腠者、
--	----------------------------------	-------------	---	-------------	--	-----------------------------	----------------------------------	---	----------------

烏頭末 自四毛、漸加、

砂糖 適宜

右二味、研和、分三五、單湯、或飲劑送下、

第二湧劑 依百

主治、惡膽液諸病、諸熱、痢疾等、吐藥

中最良者、

吐根末 一分至五分

右一味、溫湯頓服、不吐者、少々加之、

第三湧劑 依百

主治、胃中粘液諸患害、吐藥中最快

者、

吐酒石 一厘六毛、至五厘、

砂糖 適宜

右二味、研和、溫湯頓服、吐後煩者、多用溫湯、

解吐酒石毒方、見
于前解毒方部、

第四湧劑

依百

主治、胃中腐壞粘液、及有惡膽汁者、

吐藥中最劇者、但此量、為得其中、

吐根末

二分

吐酒石

一厘
六毛

右二味、研合、溫湯、或砂糖湯頓服、

第五湧劑

儒門、
又蘭方、

主治、與第二湧劑同、而最緩、

遠志末

三分、至
七分、

右一味、溫湯、頓服、或用杜衡、亦可、

依百、以五分、當
吐根三分三厘、

常用湧劑

自製

主治、與第二湧劑同、吐根難常得、宜

用此方代之、

舶來上好常山末

四分、或五分、

木香末

一分、或二分、

右二味、調和、溫湯頓服、不吐加之、

綿馬散

藥鏡

主治、組條蟲、斷食一日、後用此方、

綿馬根末

右一味、取二三錢、早旦空心、以芳香藥露水類服、**虛大**
小兒、減量、服後、經一二時、服碧雪下散、石榴根皮、
亦効、不及此方、

解瀲下散

遠名

主治、瀉留飲停水、粘液膽液病、服之則瀉、

又治黃疽痛風傷冷毒、粘液腫、內藏閉塞等、無壯熱者、

葯刺巴末

ヤールツバ
自八厘、
至五分、

右一味、和砂糖、或石鹼雞子黃用、或加碧雪丹、用	之水腫、加純精酒石、或為酎劑、即藥莉酎、見于製藥帳秘	清涼通利散依百 主治、見于下實芰浸下、	寔吉打力思ジキターリス 二分三厘 砂糖三錢	右二味、為散、分二十、旦夕服一分、弱者、減量、強者、	漸加、至發吐下、病人易吐者、加阿片少許緩之、	肝硫散依百 主治、水銀毒吐涎、齒牙浮動、又治胃虛	嘔吐、	肝色硫黃一分、至一分七厘、製法、見于製藥帳秘、	右一味、白湯送下、服後、與酸味飲液、治嘔吐、用克酸
--------------------------------	--	---	--	-----------------------------------	-------------------------------	--	------------	---	----------------------------------

諸藥、並同、名曰硬氣劑、治水銀毒一法、加龍腦阿片等、
不用散味飲液、

究理堂備用方府中編卷之一

畢

究理堂備用方府中編卷之二

平安小石龍元瑞父 輯

近江福嶋弘 元輔 仝参

平安吉岡彦龜萬齡 仝参

丹後萩野謙 受益 編次

長門赤川恒 子好 校

鍊部 方六首

壯脰鍊 布斂 主治、白帶下、淋病、粘液不止、肌肉消瘦

者、

白桂末 代用肉桂 機那末 橙皮末	桂皮末 各五分 橙皮末舍利別 適宜、製法、見製藥帳秘、	右五味、合勻、每用一錢、日四次、單湯、或飲劑送下、	安息香鍊 自製 主治、咽喉肺諸病、咳嗽声喎等、	安息香 二錢四分 甘巴旦杏仁 八分、代用榛實、或胡桃、	右二味、研合、蜜鍊、每用黑豆大、白湯、或石蜜湯送	下、	底野迦 衣百、勿搦祭 主治、虛寒粘液諸病、痙攣嘔吐	咳嗽惡性熱等、發汗催睡、又外傳、治諸毒創、	桂皮末 益智末 乾姜末 各十錢
--	---	----------------------------------	--	---	---------------------------------	-----------	--	------------------------------	---

纈草根末 二十錢

精製阿片 三錢、葡萄酒九錢浸溶解、精製法、見于製藥帳秘、

蜜 九十六錢、煮去沫者、

右六味、先研合下二味、入餘藥、搗熟貯、每用半錢、至一錢半、單湯送下、惡性熱、加龍腦 少許 橙汁、或醋溶化用、

單味底野迦 削墨

主治、天行疫、凶惡諸熱、痘瘡虛症、

泄瀉下利等、發汗、惡心、

蝮蛇 生活者

右、去頭尾皮腸、留心肝、又割血脈、出畜血、洗淨、細剉、石臼內搗爛、取出、入鍋內、上下加火焙乾、如作

蒸餅泔、再入石臼內搗碎、加上好蜜、鍋內炒過、乘熱研末、別蜜水等分、磁罐內煮八半時、徐々攪之、要不焦黑、候粘沫湧沸、下火、以布濾過、再入罐內、微火煮、水氣盡、後投前末、攪不住手、又煮四半時、候和下火、猶攪、冷定貯、每用半錢、至二三錢、單湯送下、

潤腸鍊自製

主治、老人婦女、腸液枯燥、大便秘結

者、

麻仁

桃仁

胡麻仁

各七錢

香橙皮末

二錢

右四味、研合、蜜煉、每旦空心、胡桃子大、單湯送

下、	碧雪鍊 禮嵩 主治、惡膽液諸病、熱病、痘瘡、腸間腐壞	宜下者、	碧雪丹 八厘、至二分四厘、 大黃舍利別 一錢、至二錢、製法、見于製藥帳秘、	右二味、合和、頓服、單湯、或飲劑送下、小兒酌量、					
----	---	------	---	--------------------------	--	--	--	--	--

糕部 方四首

硫黃糕 原蘭局硫黃舍利別

主治、肺病、咳嗽、

硫黃鍊華 一分

常用舍利別 適宜、製法、見于製藥帳秘、

右二味、合和、取少許、頻々服之、單湯、或飲劑送下、

祛痰健化糕 自製

主治、胃中酸液粘液作咳者、小兒

最妙、

丁香 一錢

小茴香 二錢

桂皮 一錢

胡椒 三分

榛子仁 二百個

右五味、為末、取少許、常用舍利別和用、粘液甚者、

去榛子仁、加硃砂少許、並單湯送下、

礞砂糕遠名 主治、胃腸粘液、粘液熱病、及水腫經閉、	諸藏壅閉等、	礞砂八厘至三分 常用舍利別適宜	右二味、合和、一日服、單湯送下、下利者、和苦味香	竄藥用、	水玉糕藥鏡 主治、肺胃粘液諸病、	半夏末八厘、至二分五厘、 常用舍利別適宜	右二味、合和、一日服、單湯送下、		
---	---------------	--	---------------------------------	-------------	--	---	-------------------------	--	--

液部 方九首

衝逆刺衝液

遠名

主治、**虛症**昏冒、**瘧**、子宮癰、惡心

嘔吐、呃逆風氣痞滯等、痰喘壅滯者、亦効、

薄荷油 二滴

石蜜 一錢

右二味、研和、白湯調用、

第二刺衝液

依百

主治、**寒性**頭痛、失氣瘧、癰、

舞躁病、風氣痞滯、諸麻痺者、

葛越布 カエブ テ二滴、至十二滴、

砂糖 適宜

右二味、研和、白湯調用、

鎮瘧液 室速

主治、瘧、瘧、不冝阿片劑者、

機那耐 續草耐 蛇根耐 各四錢	鹿角精 琥珀油 各一錢、五物製法、並見于製藥帳秘、	右五味、先以下二物合勻、入餘藥調和每用八分、	至一錢六分、單湯、或砂糖湯和用、如無蛇根耐、則	以倍量續草耐代之、	第二鎮痙液 自製 主治、子宮瘤、昏暈痙孿等、	薄荷露 十錢 息神液 十五滴	硃砂精 七分五厘、製法見于製藥帳秘、	右三味、合和、每用七滴、至二三十滴、單湯、或砂糖	湯調用、
---	--	-------------------------------	--------------------------------	------------------	---	--	--	---------------------------------	-------------

健胃液

自製

主治、胃弱不食嘔吐等症、又長服緩和

諸劑、以為胃氣弛弱者、副用此方、

香櫞皮油

一錢、無則代用回青橙皮油柑皮油製法、並見于製藥帳秘、

葡萄酒

十錢

右二味、調和、每用二三十滴、單湯、或白湯和用、

鎮嘔液

原我
尔

主治、諸熱、嘔吐不止者、

薄荷露

二十四錢、製法、見于製藥帳秘、

回青橙汁

三錢

葡萄酒

五錢

粟穀舍利別

四錢、或五六錢、製法見于製藥帳秘、

右四味、調和、每用一匕、單湯或、和單用、

第二鎮嘔液

武郎

主治、小兒吐哕、逆氣不止者、用之

大人亦効、	葡萄酒 二十 四錢 息神液 八分、製法 見于下、 藿香露 十六錢、 製法、見	于製藥 帳秘、	右三味、和勻、二三滴、至十四五滴、白湯和用、	消風液 自製 主治、風氣腹滿腹痛、又治子宮衝逆、	噫氣不止、	回青橙皮露 製法、見于 製藥帳秘、 薄荷露 各等 分	粟穀舍利別 適宜	右三味、調和、每用一匕、單湯、或白湯、	息神液 拔局 即舍電發謨、 牢達扭謨律規需謨、 (セイデンハムニ ユムリタイジユム) 主治、神經感觸
--------------	--	-----------------------------------	-------------------------------	---	--------------	--	--------------------------------	----------------------------	---

太甚諸症、不寐疼痛癰孿等、又發汗、驅風、止嘔吐下氣、	阿片 精製者十六錢 泊夫藍 八錢 桂屑 上好者	丁子屑 各一錢	右四味、以葡萄酒九十六錢浸、時々振盪、四日後、	紙濾過、硝石壘固封貯、每用一分、至二分、砂糖湯、	或姜湯和用、 戾局、無泊夫藍、	第二息神液 戾局、即丁幾丟尔阿芙蓉方、亦通稱牢達扭謨律規需謨、 主治、与上同、	阿片 精製者、八錢、	右一味、以火酒六十四錢浸、微火溶紙濾過、密器貯、	家方、酌、或用丁子耐、製法見于製藥帳秘、
-----------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---	--	----------------------------------	---------------------------------	--

爽涼湧劑 遠名 主治、熱病、有焮衝候、不宜尋常吐法、	及大吐者、	吐酒石 八厘 薔薇露 五十錢 覆盆子舍利別 八錢二味	製法、並見于 製藥帳秘、	右三味、調勻、每用二匕、數取輕吐、服後與溫湯、					
--	--------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

浸部 方四首

玫瑰浸

利加

主治、諸失血、衄血、咳血、嘔血、婦人崩漏、

又為喉風嗽劑、

玫瑰花

曝乾去萼者八錢

砂糖

八錢

再留綠礬油

五分、製法、

見于製藥帳秘、

右三味、先以溫湯三百二錢、漬玫瑰花二時、入

綠礬油、混和、濾過、入砂糖烱化、每一時、服三七、

機那浸

依百

主治、復纖維衰弱、療間歇熱、並胃氣虛弱

者、似方此方、以代幾那塩、

機那粗末

八錢

煨於菟乳

三錢、一法、幾那四分之一、

右二味、熟研、沸湯六十四錢、加火酒少許、冷定、密絹濾過、去滓服、每用一盞、或二盞、

石灰水

窠篤

主治、酸液諸患、惡瘡沈痼、黴毒、瘰癧、腺腫、

結石等、

生石灰水

製法、見于下編、

右一味、單用、冷服為妙、如用為煎料、則大忌配酸性藥品最禁食酸味品、石灰、勿用帶炭酸者、

實芰浸

窠篤

主治、水腫、顏面慘澹、皮膚冷而柔軟、

其脉弱而不齊、血行不順、兼閉塞者等、本藥用之水腫、此方優於丸散、煎用亦同、

實芟答利斯

自三分三厘、至一錢二分、

右一味、溫湯四十八棗、或九十六棗浸用、龍按此方、以為一日之量、則太多矣、然大抵浸煎用之多於末服、服少量、一日四厘六毛、大量一日一分●厘二毛宜以此為準、●衷用之、

漿部 方八首

清涼醒神漿

失勃

主治、耳聾熱性者、

硝石 一錢

硃砂 五分

吐酒石

一厘六毛

右三味、以水四十八錢研勻、每用一盞、日三五服、

鉛糖漿

布斂

主治、處女肺勞、

加密列露

三十錢

鉛糖

一厘六毛

息神液

三十滴

橙汁舍利別

適宜、三味製法、並見于製藥帳秘、

右四味、混和、每一時服一小匕、

龍曰、此方、服之有發嘔者、宜自少漸加、

滋肺漿

原蘭方、巴旦杏乳畧方、即甘

主治、胸肺諸病、咳嗽者、

榛子仁

五錢

砂糖

適宜

右二味、研和、加水二合、濾過、一日或兩日服、水或 代大麥煎、方見于上編	御米渾武郎 主治、小兒咳芒欲瘞者、	罌粟子 少許	右一味、以乳汁煮、去滓用、	清潤漿 撒謨 主治、熱炎熾盛、津液燥涸、血液濃厚者、	回青橙汁	右一味、加砂糖、溫湯調和用、	潤燥漿 藥鏡 主治、熱病津液涸竭、煩渴者、	無花果 乾葡萄 各八錢 大麥煎 百六十錢
---	---	------------------------------	----------------------	--	-------------	-----------------------	---	---

蒸餾水

八十錢、製法、
見于製藥帳秘、

右四味、文火煮取百六十錢、加砂糖用、和胸則忤

砂糖、加甘草二錢、同煮亦可、

第二潤燥漿

自製、原
亞局、

主治、同前、又腐敗熱、及熱病、兼

衰弱者、最宜此方、

硫黃精

五分、製法、見
于製藥帳秘、

砂糖

三十
錢

大麥煎

百六
十錢

右三味、合和、微溫用、

亞刺比亞趨謨漿

遠名

主治、緩和、鎮痛、又能解中毒、

亞刺比亞趨謨末

八錢

右一味、以水五十六錢、研和煮為粘漿用、

蜜部 方三首

海葱蜜

遠名

主治、膠粘液壅滯、痰咳喘急、又通小便、

海葱醋

四十八銖、製法見于醋部、

蜜

九十六銖、煮去泡沫、

右二味、入硝子壘、振盪混和、再傾入磁鍋內、煮為蜜之稠、

涼蜜

原李子十全蜜醋

主治、清熱、利尿、通閉塞、和乾咳、又為

外用、

醃醋

四十錢

蜜

百四十錢

右二味、調勻聽用、

玫瑰蜜

拔局

主治、清涼、強壯、和痛、收斂、救敗、

方見于下
編塗劑部

酒部 方十一首

壯腴耐

布斂

主治、纖維衰弱諸症、白帶下淋病、

不因黴者、

鐵屑

機那粗末

白桂粗末

原用
肉桂

桂皮粗末

各一
兩

右四味、火酒百九十二錢浸、安暖處一日夜、濾過

貯、每用一匕、日三、漸加、

洎夫藍酒

自製

主治、悅懌神氣、回復疲勞、

洎夫藍

四錢

右一味、醇酒一升浸、密封八日、每用一盞、日數次、

回春酒 自製 主治、神氣虛之、流凝慢弛、及胃弱、風氣等、		大茴香 七錢 丁香 一錢五分 桂皮 二錢 益智 三錢		白檀 二錢 機那 二錢 砂糖 百錢		右七味、為粗末、火酒一升浸、為大陽煎、砂糖化盡、為度、每用一小盞、或去白檀機那、加龍腦泊夫藍、		健胃酒 我尔 主治、胃弱、腐壞、萎黃病等、		羌活 水楊梅 各八錢 良姜 四錢 薄荷		珊篤里草 サントリイ 各一握、代用野艾蒿、 蘆薈 一錢 瀉利塩 三錢		右七味、為粗末、葡萄酒二壘、或水酒各半 量多為妙 浸、	
---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--

三五日、每用一盞、空心服、	健胃耐 武郎 主治、胃弱、又小兒吐哕、因乳汁變惡者、	宜令其母飲之、	益智 良姜 各八錢 丁子 四錢 洎夫藍 二錢	藿香 一握 大茴香精 百五十六錢、製法、見于製藥帳秘、	右六味、合浸三五日、每用一小盞、空心服、	礬幾耐 並局 主治、血液烺解腐壞、及胃氣虛衰諸症、	又強壯神經、及心藏子宮、	綠礬精 二十錢 幾那耐	桂皮耐 各八十錢、製法、並見于製藥帳秘、
----------------------	--	----------------	--	--	-----------------------------	---	---------------------	-----------------------------------	--

右三味、合勻、服法、一日三五十滴、至百滴、

麻沸酒

依百又蒲字

主治、奪神經知覺、故治不寐、諸痛、

狂癲等、

番茄

十六錢

無灰酒

六十錢

火酒

十六錢

右為粗末浸、大陽煎二三日、每用二三十

滴、至五十滴、

按●俗所謂●汗藥者、或是又按、時珍云、麻子花等分、熱酒調、服三錢、少

頃昏、

葶菜酒

我尔

主治、壞血病、粘稠性者、

葶菜葉

生鮮者、三握、

沙蘿蔔根

生鮮者

回青橙皮

生鮮者、各八錢、

右三味、細剉、以白葡萄酒八合浸、硝子壘中密封、	數日後、去滓聽用、	蠲蠱耐私微 主治、蠱毒諸症、	猛汞六厘六毛、製法、見于製藥帳秘、 龍腦三分三厘 息神液二十滴	右三味、先以十六錢水、溶化猛汞、以十六錢アラキ亞刺吉酒、	印度產者、代用火酒、 溶化龍腦、而後三物合和、一日服	十滴、至二十滴、兼施大黃芒硝下劑、原方與此小異、見于內科撰要注、	吐酒貝私 主治、瘧熱、及諸病、宜吐者、	肝色安質謨アンチモ十六錢、製法、見于製藥帳秘、	上好白葡萄酒百九十錢
--------------------------------	------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	---	---	----------------------------------

右浸一日夜、取澄清、每用十錢、至二十四錢、餘滓再入前量酒、浸三日而用、更良、如此可以至九次、最後餘滓、重入于小磁壺、熱灰中埋、鐵匕攪不住、手八分時、收貯、其功勝於初製肝色安質謨云、
強壯通利酒 我尔 主治、血脈運行不及作腫者、

水楊梅根

八錢

山奈

四錢

杜松子

八錢

獨活子

四錢

薄荷

二溢

右五味、粗末、以葡萄酒一壺半、浸三日、或五日去滓聽用、

醋部 方六首

海葱醋

遠名

主治、因粘稠液、頭痛痰咳、為蜜用之

為妙、

見于前
蜜部

海葱

十六
爻

蒸溜醋

九十
六爻

右二味、入硝子壘、**安**于微火上、浸出藥氣八日、絞取

汁、更加火酒八錢、靜定去底滓、硝子壘固封貯、

鎮瘧醋

遠名

主治、諸瘧、狂癰、及上衝、頭痛、不寐、

鬱憂、又用之腐敗胆液病、胆液**熱**

依百

蒸餾醋

常用舍利別

鎮痛液

各適
宜

右三味合、每半時与一匕依百、有酒石塩、

龍腦醋

原遠名

主治、壯熱、燉衝稍減、宜發汗者、

龍腦

一分

蒸餾醋

八錢、製法、見于製藥帳秘、

右二味、調勻、每半時用一匕、或加砂糖用、

乙方龍腦醋

布斂

主治、與前方同、產後迷乳、精神錯亂、

亦宜此方、

醖醋

四十錢

龍腦

三分三厘

佛手柑瓢舍利別

八錢、代用回青橙汁舍利別、製法並見于製藥帳秘、

右三味、合和、每用一匕、日三次、

接骨木醋

我尔、分量、余所考定、

主治、清涼、疏解、

接骨木花及子

生者百錢

醖酢

二百錢

右二味、入硝子壘密封、大陽煎數日、濾過去滓、

硝子壘密封貯、

薔薇醋

我尔、從玫瑰醋法、

主治、清涼、滋潤、

野薔薇花

稍乾者、去蒂、五十錢、

釀酢

二百錢

右二味、製泔、與接骨木醋同、

民埕列里精

遠名、並藥鏡、

主治、開達鬱塞、鮮泐粘稠、而

無衝動之害、為發汗良藥、故傷冷痛、胸脇痛、

腐敗熱、神經熱等用之、

製法、見于製藥帳秘、

硃砂條下

右每用、取一錢至三四錢、和飲液服、一日量

八錢、至十六錢、神經熱、和纈草根煮汁用、

餌部 方三首

滋養涪

原蘭方

主治、血液竭乏、纖維萎衰者、及惡粒食、

而漸虛脫者、此方滋養之最良者、

雌雞

一隻、去諸藏、切片肉、槌碎骨、切

精米

四勺

食塩

一錢

右三味、水三升、煮兩三時、候熟爛、取汁用、

滋養糕

即雞命圓

主治、**儼家**虛羸者、及老人婦人、血液乏

少虛弱者、又求嗣用溫泉浴法者、必用此方養之、

方見于丸散方府、

鹿角膠

叔墨

主治、血液費耗虛衰者、又和挛急刺痛者、

咍喉炊衝、為嗽劑、

鹿角屑 適宜

右一味、以水若干、煮一時許、以煮汁、試滴于漆器
上、凝者乃或濾過、放冷于淨盆內、則坭濁自沈
于其底、除去貯之、臨用、取適宜、加砂糖啖之、惡
肉味者、此方特良、

究理堂備用方府中編之二 畢

究理堂備用方府中編卷之三

平安小石龍元瑞父 輯

近江足立李忠藎卿 筆錄

平安澤田喬連伯環

同 中川元楨伯幹 仝校

越前井代允濟子愛

單用製藥品主能服法

糖製 即舍利別

玫瑰花舍利別

主能 清涼、收斂、強壯、故治吐血崩漏諸失血、又療傷冷毒咳嗽、

服法 無定量、多用則至十六錢二十四錢、單湯或飲劑送下、

蜀葵舍利別

主能 和酷厲液、緩急迫、止疼痛、疏粘痰、令易吐、故治咳嗽、咽喉痛、胸肋痛、傷冷毒、肺諸病、淋痛、又利尿、滑屎、又療膀胱諸患、

服法 八分、至四錢、單湯或飲劑送下、加他藥劑至八錢、

石長生舍利別	主能 和酷厲液分利粘液疏痰令易咯故治	胸肺諸病及內藏硬結肝脾腸間膜壅塞發汗	利小便又療腎膀胱諸患	服法 無定量單湯或飲劑送下	複方粟穀舍利別	主能 緩急疏痰催睡、	服法 無定量、 宜照粟穀舍利別服法、不宜過用、	單湯或飲劑送下、	粟穀舍利別
--------	--------------------	--------------------	------------	---------------	---------	------------	--------------------------------	----------	-------

主能 催睡止痛、甘和酷厲液及鹹渣、泄之汗孔、故治傷冷毒咳嗽咽喉痛胸肺諸病、

服法 一錢、至八錢、小兒半錢至三錢、此劑八錢之功用、當精製阿片一厘六毛、熱湯攪和、臨臥服、或飲劑送下、或分服數次並可、

回青橙汁舍利別

主能 生津治渴解熱、療膽液酷厲腐敗之病、復衰弱、故諸熱、腐敗熱、疫班熱、痘瘡、膽汁熱、並効、

服法 取一二錢、單湯或大麥煎攪和、頻々服之、

沸手柑瓢舍利別

香櫞同

主能 與回青橙同功用、以物難多得、故常用	回青橙、	服法 與回青橙同、	覆盆子舍利別	主能 收斂、清涼、滋潤、故治壯熱病、膽液熱、煩渴、	眩暈、熱病下利、赤痢、口咽焮腫、又有健胃功、	服法 與回青橙同、	桑椹舍利別	主能 進食、止煩渴、功用、與覆盆子同、	服法 與回青橙同、
----------------------	------	-----------	--------	---------------------------	------------------------	-----------	-------	---------------------	-----------

烟草舍利別

主能 有解凝麻痺之効力、故治粘液性喘急及
疫咳、多用發嘔、故又用之吐劑、

服法 初用微量、漸加、取吐者、以加為度而止、單
湯和用、

大黃舍利別

主能 下腐敗膽液、及一切惡液、取輕利、此方甚
妙、又用之小兒、易服殊佳、

服法 每用一錢至二三錢、數服、單湯送下、

杜松子傑列乙

主能 利小便、通月經、	服法 一錢至八錢、加他藥劑中用、	酎製	桂皮酎	主治 強壯衰弱、爽快精神、止諸失血下利脫泄、	比露水、多收瀋力、	服法 十二滴、至三十滴、日三四次、或單用或加	飲劑中、或葡萄酒和用、	阿魏酎	主能 子宮衝逆、及痙攣搐掣諸症、並有奇功、他與
--------------------	-------------------------	-----------	------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------	------------	--------------------------------

葛私多僂謨同、或副用纈草、阿片、硃砂精、	葛私多僂謨、開頭腦神經之壅塞、鎮痙攣搐掣、	治子宮衝逆、及衰弱、其他鬱憂病、頭旋顫掉、喘息	多粘液者、經閉因子宮病者、惡露不下者、並有	奇功、或副用纈草、阿片、阿魏、硃砂精、	然此物惡臭難服 今多代阿魏	服法 五滴、至十五滴、砂糖湯或飲液和用、	茉莉酹	主能 屬纖維弛緩粘稠質水腫、蟲症、甚効、瀉水、	利小便、或加桂皮山奈末、用之下停水、健胃腸、
-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	-----------------------------	------------	--------------------------------	-------------------------------

服法 五滴、至十五滴、不知加用、**砂糖湯**和服、

海葱酊

主能 性溫、鑽透、刺戟、疏解粘液、利小便、故治泌
別諸器衰弱、及寒性粘液水腫、小便閉塞等、此
方不作嘔、

服法 十滴、至二十滴、隨症增減、**砂糖湯**、或單湯
和服、

鐵屑酊

主能 萎黃病、經閉、及水腫、自纖維弛緩者、並効、
又開通內部壅塞、回復血液惡質、

服法 五滴、至二三十滴、白湯加桂露水、或飲劑
和用、

亭長酎

主能 刺戟、衝動、融解、蕩滌、故治水腫、小便閉、
纖維弛緩、腎胞不遂、血運怠慢等者、又經閉、痲、
及癰疾、並効、其症、宜亭長劑、而患者感觸甚者、此
方緩而良、

服法 初用二三滴、加至十五滴二三十滴、覺小便
焮痛則止、砂糖湯、或大麦煎服、

熬膏

健質安那熬膏

主能 為健胃良藥、其性不利衝、不發熱、又治
萎黃病、胃腸風氣、疝痛、酸敗腹痛、脾病、鬱憂病、
虛症黃疸、白帶下、及經閉、因虛損者、

服法 一分七厘、至三分四厘、單湯、或飲液送下、
甘草熬膏

主能 緩急迫、潤乾燥、和酷厲、故治乾咳、喘急、
咽喉刺痛、化痰令易咯、

服法 無定量、飲液、或單湯送下、

烏頭熬膏

主能 性熱者發汗峻効、又利小便、故治痛風、
傷冷毒痛、拘強不逐、黴毒諸險症、腫痛瘡瘍、又治
瞳子散大、內外並用、
服法 八毛、至一分六厘漸加、覺瞑眩者止、 砂糖
研和用、
蒲公英熬膏
主能 解凝、利尿、發散、排泄、不有健胃功、故治
熱病、間歇熱、 膽液 過溢、黃疸、肝藏壅塞硬腫、脾病
鬱憂病、又除胃中粘液、分利 膽液 中粘液、淨刷
血中惡液、

服法 一日八錢、至十二錢、單湯、或飲液下、	昇露	桂皮露	主能 強壯心胃諸藏、驅散風氣、止嘔吐下利、又配	用諸鐵劑、	服法 無定量、砂糖湯、或單湯和用、	茴香露	主腦 破氣、驅風、緩急、利尿、祛痰、故治傷冷毒	胸脘病、咳嗽、疝痛、淋痛、水腫、並効、	服法 加煎劑中、或和諸舍利別用、無定量、
-----------------------	----	-----	-------------------------	-------	-------------------	-----	-------------------------	---------------------	----------------------

杜松子露	主能 利小便、通月經、殺蟲、	服法 無定量、單服、或加飲劑中用、	昇精	驅風精	主能 健運腦及心胃、治疝痛、自粘液寒氣風氣	虻蟲者、	服法 一錢、至四錢、點飲液中用、	忽布滿鎮痛液 ^{ホフマン}	主能 為鎮痙定痛聖藥、而一切神經病、並効、又
------	----------------	-------------------	----	-----	-----------------------	------	------------------	------------------------	------------------------

能發汗、利尿、微催睡、其性、揮發、透竄、不令
血液收斂清涼凝固、故治失氣昏冒、小兒癰瘰、
子宮衝逆、癰胃腸風氣、挛痛、噫氣、惡心、吞酸、呃逆、
服法 十滴、至四十滴、葡萄酒、或冷水點、或砂糖
和用、日數回、

甘硝石精

主能 開達壅塞、揮散鬱結、排除污液、疏泄腐敗膽液、
發汗、利尿、療胃諸症、子宮衝逆、胸中諸病
荏苒者、咳嗽、痰喘、風氣、疝痛、孕婦惡阻等、加清涼
劑中、降鎮血液沸騰、止渴、故治惡性熱、此藥具鎮

痛液之能、而少起熱之性故諸熱非熨衝者、並用之、又水腫、加用利尿藥殊驗、

服法 三十滴許、葡萄酒、或砂糖和湯下、日三四次、

亞的兒

主能 輕清精微、救熱神經罷幣、靈液怠慢、故治失氣、昏冒、心動悸、子宮衝逆●喘急、及疫咳、又治神經熱、腐敗熱、虛甚者、

服法 十滴、至二十滴、葡萄酒點、或砂糖和服用、
鹿角精

主能 與硃砂精相似、其性、揮發、透竄、能衝動、而	不害神經、又能稀解血液、令之健運、故治患者	虛脫、脉微小沈伏、三五不調、冷汗漏泄、氣息覺冷	等、又復諸熱病衰弱、痘瘡瘡瘍難出者、與之	能排出病毒、又救昏睡、失氣、子宮衝逆、小兒搐搦	等、龍按、子宮衝逆、痙攣等、此液功用、出硃砂精之右、	服法 五滴、至十五滴、砂糖和、或飲液調用、	硃砂精	主能 性、極鑽透、刺戟、能開壅塞、解粘稠、發汗、利尿、	通細絡之鬱滯、故治卒倒、昏睡、癰痲子宮衝逆、
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------------	------------	------------------------------------	-------------------------------

水腫、因寒液粘液壅塞者痛風、傷冷毒劇痛大勢已減、而痠疼不已者、又●●救因暴泄恐驚	縊弱致失氣暈倒者、他與鹿角精及塩、功用相同、熱性多血者、忌用、	服法 五滴、至十五滴、砂糖湯、或飲液點用、	杜松子精	主能 利尿、健胃、驅風、	服法 水腫、取三四錢、伍実芡荇利●、或海葱根●、	昇油	茴香油
---	--	------------------------------	-------------	---------------------	---------------------------------	-----------	------------

主能 為破氣驅風良藥、又稀積粘液、發汗、健胃、
消食、出乳、又療胸病、

服法 每用二滴、至六滴、和砂糖適宜、八錢湯液
送下、

杜松子油

主能 利小便、治虛寒腫、又治傷冷毒無熟者、及
風氣痞滿、又外傳治疥、痛風臃股痛、傷冷毒痛、
痔痛等、

服法 感觸甚者、六滴、至十二滴、點于煎劑飲液
中或和砂糖用、

篤耨油

主能 竄透、揮發、達細絡之壅塞、稀解粘液、濕散冷結、
發汗、利尿、故治疝痛、腎痛、淋疾、滑精、自腎
膀胱尿管之衰弱、及尿管潰瘍者、又為驅尿銳
劑、

服法 六滴、至十二滴、葡萄酒、或砂糖湯調用、勿
過二十滴、

琥珀油

主能 再留者、甚精微、揮發、竄透疏凝散結、●滿
利尿、又為鎮痙藥有峻効、故治喘急卒厥、

痲眩暈、頭痛、精神沈重、及黴毒後淋疾、白帶下、不止者、

服法 六滴、至三十滴、葡萄酒、或砂糖湯、或雞子黃和用、

製鹽

琥珀鹽

主能 有二種、其含油氣者、揮發、透竄、治精神諸病、與油粗同、而利尿發汗之効殊峻、又能通月經、結芒者、為酸性清涼藥、其効率與枸櫞汁酒石英同、故鎮痙、發汗、利尿之力甚劣、

服法 初用輕量、漸加砂糖和、飲液下、	撒兒剥禮傑列私篤 サ ル ボ レ イ ケ レ ス ト 即霸王塩、又多功塩 余家各謂雷遺塩、	主能 為鮮凝峻剂、通内部諸藏壅塞、驅腐敗膽液、	粘液、留飲、停水、故實症水腫、尤効、能解其壯熱、	煩渴、輕用、利尿、多用瀉下、	服法 半錢、至一錢、湯和服、	鹿角塩	主能 與精同、	服法 八厘、至二分五厘、飲液和服、	造釀
--------------------	--	-------------------------	--------------------------	----------------	----------------	-----	---------	-------------------	----

葡萄酒

主能 衝動心藏、及脈管、故為振起連行衰弱、健

胃腸痛防腐敗之良藥、赤者帶收斂之功、烈應設產
者、最良、

服法 無定量、用之適宜、則効、健胃湯防腐敗過用
生害、

究理堂備用方府中編卷之三
畢

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--